তুলার ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ দিনাজপুর (জেলাসমূহ:দিনাজপুর,ঠাকুরগাওঁ,পঞ্চগড়), বাংলাদেশ ।

	অঞ্চলঃ দিনাজপুর	তুলা																									সময়কালঃ ১৮০-১৮৫ দিন
	মাস	জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ)					আগষ্ট(শ্রাবণ-ভাদ্র)				সেপ্টম্বের (ভাদ্র-আশ্বিণ)				অক্টোবর (আশ্বিণ-কার্তিক)					নভেম্বর (কার্তিক-অগ্রাহণ)					ডিসেম্বর (অগ্রাহণ-পৌষ)		
আবহাওয়া সতর্কতা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	> ৩৩° সে																									
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	> ২৬° সে																									
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৯৫ %																									
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৬৬ %																									
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ৫০ মি.মি																									
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	**প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)**	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	১০৯	১০৫	৮১	৮৪	৭০	৬০	৯৩	১০৩	৭১	৬৬	৬১	৭৩	১১৯	৬২	৪২	৩৯	১১	৫	৩	০	০	০	০	৩	০	৪
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	৩২.০	৩২.১	৩২.১	৩২.৩	৩২.৯	৩২.৬	৩২.৪	৩২.১	৩২.৪	৩২.৩	৩২.৪	৩২.০	৩১.৯	৩২.০	৩১.৬	৩১.৩	৩১.০	৩০.৩	২৯.৭	২৯.০	২৮.৭	২৮.০	২৭.০	২৫.৪	২৪.৯	২৩.৯
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.৩	২৬.৭	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৭	২৫.১	২৪.৯	২৪.৭	২৩.৯	২২.৪	২০.৪	১৯.৪	১৮.৩	১৬.৯	১৫.৬	১৪.০	১৩.৩	১২.৯	১২.০	১০.৯
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৫.১	৯৪.৬	৯৪.৪	৯৪.৭	৯৪.১	৯৪.০	৯৫.০	৯৫.৭	৯৫.৬	৯৫.৬	৯৬.১	৯৬.০	৯৬.১	৯৬.০	৯৬.১	৯৬.৩	৯৬.০	৯৬.০	৯৫.৯	৯৫.৯	৯৫.৩	৯৫.৬	৯৬.১	৯৬.৪	৯৬.৩	৯৬.৬
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৭৩.৩	৭২.৭	৭১.৯	৭১.৬	৭০.১	৭০.৯	৭২.৬	৭৩.১	৭১.৬	৭২.৪	৭১.৩	৭১.৬	৭০.৯	৬৮.৩	৬৬.৩	৬২.৭	৫৭.১	৫৫.৪	৫৩.০	৫১.৬	৪৮.১	৪৭.৬	৪৯.০	৫২.৯	৫২.৭	৫৪.০
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৩.৭	৩.৭	৩.৯	৩.৭	৩.৯	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৯	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৫	৩.৫	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৫	২.৬	৩.৭	৩.০	৩.৭
ধাপসমূহ		অংকুরোদগম ও চারা গজানো		চারা সংস্থাপন			পাতা ও আচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন			 স্কয়ারিং,ফুল আসা ও বল গঠন									বলের পরিপক্কতা ও তুলা সংগ্রহ								
							←								ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট												→