পেয়ারার আগা মরা রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ:রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ,নওগা,নাটোর**), বাংলাদেশ** ।

	অঞ্চলঃ রাজশাহী	পেয়ারা																		সময়কালঃ ১৪০ দিন	
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	জানু পৌষ-মাঘ)	ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)			মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)			এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)			মে (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য)							জুন(জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়)	
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>৩৪° সে																			
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	>১৮° সে																			
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৮৮%																			
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৩২%																			
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ১০ মি.মি																			
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	4.0	3.0	2.0	3.0	5.0	4.0	3.0	4.0	14.0	13.0	10.0	19.0	17.0	24.0	29.0	33.0	36.0	34.0	48.0	51.0
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	25.6	26.7	28.1	29.3	30.4	32.1	33.1	34.6	35.0	36.1	36.7	36.4	35.9	35.4	35.3	35.1	35.0	35.3	35.0	33.9
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	12.0	12.3	13.6	14.1	15.1	16.4	17.6	19.4	20.6	22.1	23.0	23.4	23.9	23.7	24.3	24.6	25.0	25.4	25.9	26.0
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	95.3	94.0	93.9	92.0	91.6	90.3	88.7	88.3	89.1	88.9	89.0	90.1	90.7	92.1	92.7	93.3	93.1	93.7	94.6	95.4
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	44.7	42.0	40.3	36.6	34.6	32.7	30.4	30.4	35.9	34.3	34.6	41.4	45.1	50.0	51.9	55.6	58.3	58.9	62.6	67.9
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	51.0	55.0	56.0	58.0	59.0	59.0	59.0	59.0	52.0	57.0	57.0	57.0	56.0	52.0	53.0	54.0	48.0	51.0	48.0	35.0
ধাপসমূহ		ফুলের কুড়ি বের হওয়া		ফুলের কুড়ি দৃশ্যমান হওয়া		ফুলের প্রস্ফুটন			ফল ধারণ			ফলের বৃদ্ধি						ফল পরিপক্ক হওয়া			
											আগা মরা											