**আমের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ যশোর** (জেলাসমূহ:যশোর, কুষ্টিয়া,চুয়াডাংগা,ঝিনাইদাহ,মেহেরপুর, মাগুরা)**, বাংলাদেশ । রোগের নামঃ** পাউডরী মিলডিউ

| | অঞ্চলঃ যশোর | আম | | | | | | | | | | | | | | | | | | | সময়কালঃ ১৬০-১৬৫দিন | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আবহাওয়া সতর্কতা | মাস | জানুয়ারী( পৌষ-মাঘ) | | ফেব্রুয়ারী ( মাঘ-ফাল্গুন) | | | | | মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র) | | | | এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ) | | | | মে ( বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য) | | | | জুন(জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়) | | | | জুলাই( আষাঢ় -শ্রাবণ) |
| | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে) | >৩৭° সে (১১তম সপ্তাহ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে) | < ২৫° সে (১১তম সপ্তাহ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | > ৯৪ % (১২তম সপ্তাহ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | > ৪৫ % (১০ম সপ্তাহ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | বৃষ্টিপাত(মি.মি.) | > ২০ মি.মি. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া | **প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)** | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
| | বৃষ্টিপাত(মি.মি.) | ১.৫ | ২.৫ | ৩.০ | ৬.৫ | ৫.০ | ৪.৫ | ৮.০ | ৪.০ | ২.৫ | ৪.৫ | ১১.৫ | ১২.০ | ১১.৫ | ৭.০ | ১২.৫ | ২১.৫ | ২৮.৫ | ৩০.৫ | ৩৬.০ | ৪৪.৫ | ৩৮.৫ | ৪৯.৫ | ৫৪.৫ | ৮১.০ |
| | সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.) | ২৪.৫ | ২৫.১ | ২৫.৬ | ২৬.৬ | ২৭.৮ | ২৮.৯ | ৩০.০ | ৩১.০ | ৩২.৪ | ৩৩.৬ | ৩৪.৭ | ৩৪.৬ | ৩৫.৫ | ৩৬.১ | ৩৬.৫ | ৩৬.৩ | ৩৬.০ | ৩৬.০ | ৩৫.৯ | ৩৫.৫ | ৩৫.৬ | ৩৫.৩ | ৩৪.০ | ৩৩.৩ |
| | সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.) | ১০.৭ | ১১.০ | ১০.৮ | ১২.০ | ১৩.৩ | ১৪.৭ | ১৫.৬ | ১৬.৪ | ১৭.৭ | ১৯.০ | ২০.৮ | ২১.৮ | ২২.৮ | ২৩.৫ | ২৪.১ | ২৪.২ | ২৪.২ | ২৫.২ | ২৫.০ | ২৫.৫ | ২৬.০ | ২৬.২ | ২৬.২ | ২৬.১ |
| | সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | ৯৫.৩ | ৯৫.৩ | ৯৪.৯ | ৯৪.৯ | ৯৪.২ | ৯৪.০ | ৯৩.৭ | ৯৩.২ | ৯২.৫ | ৯২.১ | ৯২.১ | ৯২.৪ | ৯২.৪ | ৯২.৯ | ৯২.৪ | ৯২.৩ | ৯২.৮ | ৯২.৭ | ৯৩.১ | ৯৩.৬ | ৯৪.০ | ৯৪.১ | ৯৪.৮ | ৯৫.৭ |
| | সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%) | ৪৭.৯ | ৪৭.০ | ৪৪.৭ | ৪৪.২ | ৪২.২ | ৪১.০ | ৩৯.৩ | ৩৬.৫ | ৩৫.৪ | ৩৪.৯ | ৩৬.৭ | ৪২.০ | ৪১.৫ | ৪১.৬ | ৪৪.৩ | ৪৬.৯ | ৪৯.৯ | ৫১.৭ | ৫৪.৮ | ৫৮.৭ | ৬০.০ | ৬২.১ | ৬৭.৫ | ৭১.৭ |
| | সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা) | ৪২.৫ | ৪৪.৫ | ৪৮.০ | ৪৭.৫ | ৪৯.৫ | ৫০.০ | ৫৪.৫ | ৫৫.০ | ৫৪.০ | ৫৫.০ | ৫৩.০ | ৫১.৫ | ৫৫.৫ | ৫৪.৫ | ৫৪.৫ | ৫৫.৫ | ৫৪.০ | ৫১.৫ | ৫২.৫ | ৪৬.৫ | ৪৫.৫ | ৪১.৫ | ৩২.০ | ২৬.৫ |
| **ধাপসমূহ** | | শীর্ষকুড়ির স্ফীতি | | শীর্ষকুড়ির প্রসারণ | | | মঞ্জরীর বর্ধন ও ফুল আসা | | মটরদানা পর্যায় | | | | ফল বৃদ্ধি পর্যায় | | | | | | | ফল পরিপক্ক ও সংগ্রহ পর্যায় | | | | |
| | | | | ← | | | | | | | | → | পাউডরী মিলডিউ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |