


লিচুর ফল পোড়া রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রংপুর অঞ্চল (জেলাসমূহ: রংপুর,কুড়িগ্রাম,গাইবান্ধা,নীলফামারী,লালমনিরহাট), বাংলাদেশ ।

অঞ্চলঃ রংপুর	লিচু																								সময়কালঃ ১৬৮দিন		
	জানুয়ারী( পৌষ-মাঘ)						ফেব্রুয়ারী ( মাঘ-ফাল্গুন)						মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)						এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)						মে ( বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)		জুন(জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস																										
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)																									>৩২°সে	
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)																									>২৩°সে	
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)																									>৯২.৫%	
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)																									>৬২.৫%	
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)																									>৪৫ মি.মি.	
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	১	৩	২	১	১	২	৪	২	৩	১	৩	৬	১৯	১১	২০	২৯	৩২	৫০	৪০	৬৫	৬২	৮৭	১০৭	৯১		
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২২.৭	২২.৪	২৩.২	২৩.৪	২৪.৭	২৫.৯	২৬.৭	২৭.৫	২৮.৫	২৯.৯	৩০.৮	৩১.৬	৩১.৪	৩২.১	৩২.৫	৩২.৩	৩২.০	৩১.৯	৩২.৫	৩২.৭	৩২.২	৩২.৮	৩২.৭	৩২.৪		
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১০.৯	১০.৪	১০.৮	১০.৮	১১.৮	১২.৭	১৩.৭	১৪.৪	১৫.৩	১৬.১	১৭.৩	১৮.৪	১৯.৫	২০.৩	২১.১	২১.৯	২১.৯	২২.৩	২৩.২	২৩.৪	২৩.৯	২৪.৪	২৫.০	২৫.২		
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৬.০	৯৬.০	৯৫.৮	৯৫.৭	৯৫.৫	৯৪.৩	৯৩.৭	৯২.৯	৯১.৪	৮৯.৮	৮৮.৭	৮৮.১	৮৭.৭	৮৮.৫	৮৮.৪	৮৯.৯	৯০.৯	৯২.৫	৯২.২	৯২.৯	৯২.৮	৯৩.৩	৯৩.৯	৯৪.২		
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৫৮.৫	৫৭.৮	৫৬.২	৫৪.২	৫১.৬	৪৮.০	৪৭.১	৪৫.৩	৪২.৮	৩৯.৬	৪০.৮	৪২.৫	৪৮.৮	৪৯.৭	৫০.৭	৫৬.৭	৫৯.০	৬২.০	৬২.০	৬২.৯	৬৫.৮	৬৬.৭	৬৯.০	৭০.৭		
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৩৬.০	৩৬.৫	৩৯.৫	৪১.০	৪৪.০	৪৮.৫	৫০.০	৫১.৫	৫৬.৫	৫৭.৫	৫৭.০	৫৪.০	৪৯.০	৫১.৫	৫১.০	৪৭.৫	৪৭.০	৪৬.৫	৪৭.৫	৪৯.০	৪১.০	৪০.৫	৩৮.০	৩১.৫		
	ধাপসমূহ																										
ফুলের কুড়ি গঠন						পুষ্প মঞ্জুরী বের হওয়া			ফুল ও ফল ধারণ			ফলের বৃদ্ধি						ফল পরিপক্ব হওয়া ও সংগ্রহ									
রোগ	