























রবি মৌসুমের মরিচ ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফল ছিদ্রকারী পোকা): বরিশাল অঞ্চল (জেলা: পটুয়াখালী, বরিশাল, ঝালকাঠি, বরগুনা, ভোলা), বাংলাদেশ

অঞ্চল : বরিশাল		রবি মৌসুমের মরিচঃ (ফল ছিদ্রকারী পোকা)													সময়কাল : ১৮০-১৮৫ দিন							
আবহাওয়া সংক্রান্ত	মাস	নভেম্বর			ডিসেম্বর			জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি				মার্চ							
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	সমস্ত পর্যায়ের জন্য সর্বোচ্চ প্রান্তিক তাপমাত্রা হল ৩৭°সেঃ, এবং ৪০°সেঃ প্রাণনাশক; ডিম, কীড়া, পুত্তলি- এর বিকাশের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা প্রায় ২৪-২৭°সেঃ																				
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	সর্বনিম্ন প্রান্তিক তাপমাত্রা হলো প্রায় ১০-১২°সেঃ																				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	প্রায় ৮৫%																				
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	<৩৫%																				
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাতের সাথে নেতিবাচক অনুবন্ধ																				
সাপ্তাহিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	১০০.০	৯.০	৬.০	৭.০	১.৭	৪.০	১.৩	০.৭	১.৩	১.০	১.০	১.৭	২.৭	৩.৭	৫.০	৮.০	৫.৭	৫.৩	৬.০	১৪.৩	১৮.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩১.২	২৯.৬	২৯.৩	২৮.৩	২৭.৮	২৭.০	২৬.২	২৫.৭	২৫.১	২৫.২	২৫.৮	২৬.২	২৭.০	২৭.৮	২৮.৯	২৯.৭	৩০.৭	৩১.৭	৩২.৭	৩৩.০	৩২.৯
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৬.০	১৯.৬	১৮.৪	১৬.৭	১৫.৬	১৪.৯	১৪.০	১৩.১	১২.৬	১২.৫	১২.৭	১২.৫	১৪.০	১৪.৬	১৬.২	১৬.৯	১৮.৩	১৯.৫	২০.৫	২২.১	২২.৮
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৭.৪	৯৭.৮	৯৭.৮	৯৭.৮	৯৮.০	৯৭.৯	৯৮.২	৯৮.২	৯৮.০	৯৭.৮	৯৭.৬	৯৭.৬	৯৭.৩	৯৭.১	৯৭.০	৯৭.০	৯৬.৭	৯৭.১	৯৬.৭	৯৬.৫	৯৬.৫
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭৮.৯	৫৬.৬	৫৩.৭	৫১.৮	৫০.৬	৫০.৯	৫০.৭	৫০.৩	৫০.১	৪৯.৩	৪৮.৫	৪৫.২	৪৬.২	৪৪.৮	৪৬.২	৪৫.১	৪৪.৯	৪৫.২	৪৫.৩	৫০.৭	৫৪.৪
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	২৬.০	৪৯.০	৫০.০	৫১.৩	৪৮.৭	৪৬.৩	৪৪.৩	৪৩.৭	৪৬.৭	৪৪.০	৪৭.৩	৫২.৭	৫০.৩	৫২.৩	৫১.৭	৫২.০	৫৩.৭	৫৪.০	৫৪.৩	৫২.৩	৫০.৭
	৬.৪	২.৭	৩.৩	৩.৬	৩.১	৩.৪	৩.৩	৩.৯	৪.৫	৪.৪	৪.৫	৪.৩	৫.০	৪.৬	৪.৯	৪.৯	৫.১	৫.২	৫.৪	৬.৩	৬.৭	
ধাপ সমূহ																						
					উদ্ভিগ্জ বৃদ্ধি			ফুল এবং ফল				ফসল কাটা										
পোকাকার জীবন চক্র																						
				ডিম (২ থেকে ৪ দিন)	লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)	পুত্তলি (৭ থেকে ১০ দিন)	পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)	ডিম (২ থেকে ৪ দিন)	লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)	পুত্তলি (৭ থেকে ১০ দিন)	পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)											

খরিফ মৌসুমের মরিচ ফসলের পোকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফল ছিদ্রকারী পোকা): বরিশাল অঞ্চল (জেলা: পটুয়াখালী, বরিশাল, ঝালকাঠি, বরগুনা, ভোলা), বাংলাদেশ

অঞ্চল : বরিশাল		খরিফ মৌসুমের মরিচঃ (ফল ছিদ্রকারী পোকা)																	সময়কাল : ১৮০-২০০ দিন																	
আবহাওয়া	মাস	এপ্রিল					মে					জুন					জুলাই					আগস্ট					সেপ্টেম্বর					অক্টোবর				
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	সমস্ত পর্যায়ের জন্য সর্বোচ্চ প্রান্তিক তাপমাত্রা হল ৩৭°সেঃ, এবং ৪০°সেঃ প্রাণনাশক; ডিম, কীড়া, পুতুলি- এর বিকাশের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা প্রায় ২৪-২৭°সেঃ																																		
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	সর্বনিম্ন প্রান্তিক তাপমাত্রা হলো প্রায় ১০-১২°সেঃ																																		
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	প্রায় ৮৫%																																		
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	<৩৫%																																		
বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাতের সাথে নেতিবাচক অনুবন্ধ																																			
প্রধানসত্ত্বাহ	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩								
বৃষ্টিপাত (মিমি)	২৫.০	৩৪.৭	৪০.৭	৫২.৭	৪৯.০	৬৯.৩	৬৬.৭	৮৫.৩	১০৫.৩	১২৯.৭	১২৬.৩	১২৯.০	৯১.৭	১১১.৭	১১৫.০	১০০.০	৯২.৭	৯৫.৭	৮২.৩	৮১.০	৭৩.০	৭৭.৭	৭২.৩	৭৫.০	৫৫.৩	৫৭.৩	৪১.০	২৫.০								
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৩.৫	৩৩.৫	৩৩.৬	৩৩.৪	৩৩.৪	৩৩.২	৩৩.৩	৩২.৮	৩১.৯	৩১.৩	৩১.০	৩১.০	৩১.১	৩০.০৮	৩১.০	৩১.২	৩১.২	৩১.২	৩১.৫	৩১.৫	৩১.২	৩১.৫	৩২.০	৩২.০	৩১.৯	৩২.১	৩২.০	৩১.৭								
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৪.৬	২৪.৪	২৪.৪	২৫.১	২৫.২	২৫.৭	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৯	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৯	২৫.৯	২৬.০	২৫.৫	২৫.২	২৫.২	২৪.৩	২২.৯								
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৬.০	৯৬.০	৯৬.১	৯৬.২	৯৬.১	৯৬.২	৯৬.৫	৯৬.৪	৯৬.৬	৯৭.০	৯৭.৩	৯৭.৪	৯৭.৪	৯৭.৪	৯৭.৬	৯৭.৪	৯৭.৩	৯৭.২	৯৭.৩	৯৭.৩	৯৭.৪	৯৭.৭	৯৭.৬	৯৮.০	৯৭.৯	৯৮.০	৯৭.৮	৯৭.৮								
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৬১.৯	৬২.৫	৬৪.২	৬৫.৯	৬৭.৫	৬৯.৬	৭০.৯	৭৩.২	৭৬.৯	৭৯.২	৮০.৬	৮০.৭	৭৯.৪	৮১.০	৮০.০	৭৮.৯	৭৮.৬	৭৯.০	৭৭.৬	৭৭.৪	৭৭.৬	৭৬.৪	৭৪.৬	৭৩.৯	৭২.৩	৭০.৪	৬৮.০	৬৩.৭								
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৪.৭	৫১.৭	৪৯.০	৪৮.০	৪৬.০	৩৭.৩	৩৭.৩	৩০.৭	২৩.০	২১.৩	২০.৩	২০.৩	২৩.৩	২১.০	২৫.৩	২৬.০	২৫.৭	২৬.০	২৭.৩	২৯.০	২৮.৩	২৯.৩	২৯.৭	৩৩.০	৩৬.৭	৪১.৩	৪৪.৭	৪৮.৭								
ধাপ সমূহ	  																																			
	উদ্ভিদ্ধ বৃদ্ধি										ফুল এবং ফল										ফসল কাটা															
পোকার জীবন চক্র	       																																			
						ডিম (২ থেকে ৪ দিন)					লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)					পুতুলি (৭ থেকে ১০ দিন)					পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)															