












রবি মৌসুমের সয়াবিনের পোকার আবহাওয়ার পঞ্জিকা (বিছা পোকা): চট্টগ্রাম অঞ্চল (জেলা: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর) বাংলাদেশ

অঞ্চল: চট্টগ্রাম		রবি মৌসুমের সয়াবিন: বিছা পোকা																জীবনকাল: ১১০-১২০ দিন	
আবহাওয়া সর্বকতা	মাস	জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল					
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	ডিম, লার্ভা এবং পিউপা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, যখন মোট বিকাশের সময়কাল এবং প্রাপ্তবয়স্কদের বেঁচে থাকার সময়কাল হ্রাস পায়। লার্ভা বিকাশের জন্য সর্বোচ্চ হতে হবে ৩৯ ± ১ (°সেঃ)																	
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	লার্ভা বিকাশের জন্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ ± ১ (°সেঃ)																	
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	উচ্চ আর্দ্রতা পোকামাকড়ের উপদ্রব বাড়ায়																	
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)																		
	বৃষ্টিপাত (মিমি)																		
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.৩	০.৭	০.৭	১.৩	২.০	১.৩	২.৩	৮.৩	৪.৭	৫.৩	৬.৩	১৩.৩	২১.৩	২১.৩	২৭.০	৩৪.৩	৩৬.০	
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৬.৫	২৬.১	২৬.৬	২৬.৯	২৭.৭	২৮.৭	২৯.৩	২৯.৮	৩০.৬	৩১.২	৩২.০	৩২.০	৩১.৮	৩২.১	৩২.৬	৩২.৭	৩২.৯	
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৪.১	১৩.৯	১৪.১	১৪.১	১৪.৯	১৫.৮	১৬.৯	১৭.৬	১৮.৮	১৯.৮	২০.৭	২১.৮	২২.৭	২৩.৫	২৪.০	২৪.৪	২৪.৫	
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৩.৮	৯৩.১	৯২.৯	৯১.৬	৯১.০	৯০.৬	৯০.৪	৯১.০	৯০.৮	৯১.১	৯১.৩	৯৩.০	৯৩.০	৯৩.৩	৯২.৯	৯২.৬	৯২.৮	
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪৮.২	৪৭.১	৪৪.৯	৪২.৩	৪৩.৬	৪১.২	৪৩.৩	৪৩.৯	৪৪.৮	৪৬.৬	৪৭.৪	৫৪.০	৫৮.২	৬০.১	৬০.৫	৬১.৬	৬২.০	
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৩.৩	৫০.৮	৫৩.৮	৫৬.৫	৫৬.৩	৫৭.৮	৫৭.৫	৫৮.৫	৬০.৩	৫৯.৩	৫৬.৮	৫৭.০	৫২.৮	৫৬.০	৫৬.০	৫৪.৮	৫৫.৩	
ধাপ সমূহ																			
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা	অগ্জ বৃদ্ধি পর্যায়				জাননিক পর্যায়				পরিপক্ক এবং ফসল সংগ্রহ পর্যায়									
জীবন চক্র																			
		ডিম	কীড়া	পুত্তলি	পূর্ণাঙ্গ	ডিম	কীড়া	পুত্তলি											