



























রবি মৌসুমের শসা ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফলের মাছি পোকা): বগুড়া অঞ্চল (জেলা: পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট), বাংলাদেশ

অঞ্চল : বগুড়া		রবি মৌসুমের শসা : (ফলের মাছি পোকা)										সময়কাল : ১০০-১২০ দিন											
আবহাওয়া সর্ভকত	মাস	ফেব্রুয়ারি					মার্চ					এপ্রিল					মে						
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঃ)											৩০°সেঃ											
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)											২২°সেঃ											
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)											৮৫											
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)											৬০											
	বৃষ্টিপাত (মিমি)											মেঘলা এবং বৃষ্টির অবস্থা											
সাপ্তাহিক ঋতুভিত্তিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২					
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	১.০	৪.০	৩.০	৫.০	২.০	৪.০	৩.০	৮.০	৮.০	১২.০	২৬.০	২৮.০	৩৭.০	৪২.০	৪৫.০	৫৮.০	৫৯.০					
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৬.৯	২৭.৭	২৮.৬	২৯.৩	৩০.৯	৩১.৯	৩২.৯	৩২.৯	৩৩.৯	৩৪.৩	৩৪.০	৩৩.৬	৩৩.১	৩৩.৬	৩৩.৪	৩৩.৩	৩৩.৯					
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৩.৬	১৪.৬	১৫.৪	১৬.৪	১৭.৪	১৮.৩	২০.০	২১.১	২২.৩	২৩.০	২৩.০	২৩.১	২৩.৩	২৩.৯	২৪.৩	২৪.৬	২৫.০					
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯২.১	৯১.৪	৯০.৪	৮৮.৭	৮৯.১	৮৬.৪	৮৬.৩	৮৭.৭	৮৮.০	৮৮.৩	৯০.৬	৯০.৯	৯২.৪	৯২.৪	৯২.৭	৯৩.০	৯৩.৭					
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪১.৪	৪০.৩	৩৯.১	৩৮.০	৩৬.৯	৩৭.১	৩৯.১	৪৫.৩	৪৪.৪	৪৫.৯	৫০.৭	৫৪.৯	৫৭.৩	৫৮.৭	৬০.০	৬৩.৪	৬৪.৬					
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫২.০	৫৩.০	৫৬.০	৬০.০	৫৯.০	৬১.০	৫৮.০	৫৬.০	৫৬.০	৫৬.০	৫৫.০	৫২.০	৪৮.০	৫০.০	৪৯.০	৪৬.০	৪৪.০					
ধাপ সমূহ																							
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		অঙ্গজ বৃদ্ধি		ফুল ও ফল						ফসল কাটা												
পোকাকার জীবন চক্র																							
					ডিম	কীড়া	পুতুলি	প্রাপ্তবয়স্ক	ডিম	কীড়া	পুতুলি	প্রাপ্তবয়স্ক											

খরিফ মৌসুমের শসা ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফলের মাছি পোকা): বগুড়া অঞ্চল (জেলা: পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট), বাংলাদেশ

অঞ্চল ঃ বগুড়া		খরিফ মৌসুমের শসা ঃ (ফলের মাছি পোকা)										সময়কাল ঃ ১০০-১২০ দিন						
আবহাওয়া সড়কতা	মাস	জুলাই			আগস্ট			সেপ্টেম্বর				অক্টোবর						
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঃ)	৩০°সেঃ																
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২২°সেঃ																
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৮৫																
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৬০																
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	মেঘলা এবং বৃষ্টির অবস্থা																
সাপ্তাহিক ঞ্চাভিতিক আবহাওয়া	প্রমাসসপ্তাহ	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৯৩.০	৮০.০	৯১.০	৭৬.০	৬৩.০	৬১.০	৭২.০	৬৭.০	৫৬.০	৬০.০	৬০.০	৭৬.০	৭৪.০	৫১.০	৪২.০	২৫.০	১৮.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩২.০	৩১.৯	৩২.০	৩২.১	৩২.৩	৩২.৬	৩২.১	৩২.৩	৩২.৬	৩২.৩	৩২.০	৩২.১	৩২.০	৩২.১	৩২.৩	৩২.০	৩১.৬
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.১	২৬.৩	২৬.৯	২৬.৩	২৬.৪	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.১	২৫.০	২৪.০	২৩.৪	২১.৭
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৫.৯	৯৫.৯	৯৫.৯	৯৫.৯	৯৫.১	৯৫.৩	৯৫.৬	৯৫.৯	৯৫.৭	৯৫.৯	৯৬.৩	৯৬.১	৯৬.৪	৯৬.০	৯৬.০	৯৫.৭	৯৫.১
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭৩.৩	৭৪.১	৭৪.৪	৭৩.৩	৭২.০	৭১.৯	৭৩.৩	৭২.৭	৭১.৭	৭২.০	৭২.৩	৭০.৭	৭১.০	৬৮.৭	৬৬.০	৬২.১	৫৭.৯
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	২৮.০	৩১.০	২৯.০	২৮.০	৩৫.০	৩৭.০	৩৬.০	৩১.০	৩৫.০	৩৫.০	৩৫.০	৩৭.০	৩৭.০	৪৪.০	৪৮.০	৫৪.০	৫৭.০
	ধাপ সমূহ																	
অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		অঙ্কুর বৃদ্ধি			ফুল ও ফল								ফসল কাটা					
পোকার জীবন চক্র																		
																		
			ডিম	কীড়া	পুত্তলি	প্রাপ্তবয়স্ক	ডিম	কীড়া	পুত্তলি	প্রাপ্তবয়স্ক								