

রবি মৌসুমের শসা ফসলের পোকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (লাল কুমড়া বিটল পোকা): যশোর অঞ্চল (জেলা: যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ

অঞ্চল : যশোর		রবি মৌসুমের শসা : (লাল কুমড়া বিটল পোকা)											সময়কাল : ১৪০-১৫০ দিন									
মাস		মার্চ			এপ্রিল			মে					জুন			জুলাই						
আবহাওয়া সর্ভকর্তা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৫°সেঃ (৩০°সেঃ সর্বোত্তম তাপমাত্রা ডিম অবস্থান এবং খাদ্য গ্রহণ উভয়ের জন্য)																				
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৫°সেঃ বা তার নিচে																				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার অগ্রগতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আপেক্ষিক আর্দ্রতার ওঠানামার বিস্তৃত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম																				
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	আপেক্ষিক আর্দ্রতার ওঠানামার বিস্তৃত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম																				
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	লাল কুমড়া পোকা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক																				
	প্রধানসমূহ	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯
বৃষ্টিপাত (মিমি)	৪.০	২.৫	৪.৫	১১.৫	১২.০	১১.৫	৭.০	১২.৫	২১.৫	২৮.৫	৩০.৫	৩৬.০	৪৪.৫	৩৮.৫	৪৯.৫	৫৪.৫	৮১.০	৭২.৫	৮২.০	৭২.০	৮৩.৫	৭৩.০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩১.০	৩২.৪	৩৩.৬	৩৪.৭	৩৪.৬	৩৫.৫	৩৬.১	৩৬.৫	৩৬.৩	৩৬.০	৩৬.০	৩৫.৯	৩৫.৫	৩৫.৬	৩৫.৩	৩৪.০	৩৩.৩	৩৩.০	৩২.৭	৩২.৯	৩২.৭	৩২.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৬.৪	১৭.৭	১৯.০	২০.৮	২১.৮	২২.৮	২৩.৫	২৪.১	২৪.২	২৪.২	২৫.২	২৫.০	২৫.৫	২৬.০	২৬.২	২৬.২	২৬.১	২৬.২	২৬.০	২৬.১	২৬.২	২৬.২
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৯৩.২	৯২.৫	৯২.১	৯২.১	৯২.৪	৯২.৪	৯২.৯	৯২.৪	৯২.৩	৯২.৮	৯২.৭	৯৩.১	৯৩.৬	৯৪.০	৯৪.১	৯৪.৮	৯৫.৭	৯৬.০	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.১
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৩৬.৫	৩৫.৪	৩৪.৯	৩৬.৭	৪২.০	৪১.৫	৪১.৬	৪৪.৩	৪৬.৯	৪৯.৯	৫১.৭	৫৪.৮	৫৮.৭	৬০.০	৬২.১	৬৭.৫	৭১.৭	৭৩.৫	৭৪.৪	৭৩.৪	৭৪.৬	৭৩.৪
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৫.০	৫৪.০	৫৫.০	৫৩.০	৫১.৫	৫৫.৫	৫৪.৫	৫৪.৫	৫৫.৫	৫৪.০	৫১.৫	৫২.৫	৪৬.৫	৪৫.৫	৪১.৫	৩২.০	২৬.৫	২৬.০	২৪.৫	২৯.০	২৫.০	২৯.৫
ধাপ সমূহ																						
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		অঙ্গজ বৃদ্ধি			ফুল ও ফল					ফসল কাটা											
পোকার জীবন চক্র																						
	ডিম (৬ থেকে ১৫ দিন)		কীড়া (১৩ থেকে ২৫ দিন)	পুতুলি (৭ থেকে ২০ দিন)	প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)	প্রাপ্তবয়স্ক (ক্ষতিগ্রস্ত ফুল এবং অপরিপক্ক ফল)																

খরিফ মৌসুমের শসা ফসলের পোকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (লাল কুমড়া বিটল পোকা): যশোর অঞ্চল (জেলা: যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ

অঞ্চল : যশোর		খরিফ মৌসুমের শসা : (লাল কুমড়া বিটল পোকা)														সময়কাল : ১৪০-১৫০ দিন													
আবহাওয়া সর্ভকতা	মাস	এপ্রিল				মে				জুন				জুলাই				আগস্ট				সেপ্টেম্বর							
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৫°সেঃ (৩০°সেঃ সর্বোত্তম তাপমাত্রা ডিম অবস্থান এবং খাদ্য গ্রহণ উভয়ের জন্য)																											
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৫°সেঃ বা তার নিচে																											
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার অগ্রগতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আপেক্ষিক আর্দ্রতার ওঠানামার বিস্তৃত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম																											
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	আপেক্ষিক আর্দ্রতার ওঠানামার বিস্তৃত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম																											
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	লাল কুমড়া পোকা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক																											
সাপ্তাহিক ঋতুভিত্তিক আবহাওয়া	প্রধানসত্তাহ	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯		
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	১১.৫	৭.০	১২.৫	২১.৫	২৮.৫	৩০.৫	৩৬.০	৪৪.৫	৩৮.৫	৪৯.৫	৫৪.৫	৮১.০	৭২.৫	৮২.০	৭২.০	৮৩.৫	৭৩.০	৬৩.৫	৫৬.০	৬৮.০	৪৮.৫	৫০.৫	৫২.৫	৬৮.০	৫৯.০	৬৯.৫		
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৫.৫	৩৬.১	৩৬.৫	৩৬.৩	৩৬.০	৩৬.০	৩৫.৯	৩৫.৫	৩৫.৬	৩৫.৩	৩৪.০	৩৩.৩	৩৩.০	৩২.৭	৩২.৯	৩২.৭	৩২.৭	৩৩.০	৩২.৮	৩২.৭	৩৩.১	৩৩.৩	৩২.৯	৩২.৯	৩৩.০	৩৩.২		
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২২.৮	২৩.৫	২৪.১	২৪.২	২৪.২	২৫.২	২৫.০	২৫.৫	২৬.০	২৬.২	২৬.২	২৬.১	২৬.২	২৬.০	২৬.১	২৬.২	২৬.২	২৬.০	২৬.২	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৩		
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৯২.৪	৯২.৯	৯২.৪	৯২.৩	৯২.৮	৯২.৭	৯৩.১	৯৩.৬	৯৪.০	৯৪.১	৯৪.৮	৯৫.৭	৯৬.০	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.০	৯৬.২	৯৬.৫	৯৬.২	৯৬.২	৯৬.৪	৯৬.৬	৯৬.৩	৯৬.৬		
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৪১.৫	৪১.৬	৪৪.৩	৪৬.৯	৪৯.৯	৫১.৭	৫৪.৮	৫৮.৭	৬০.০	৬২.১	৬৭.৫	৭১.৭	৭৩.৫	৭৪.৪	৭৩.৪	৭৪.৬	৭৩.৪	৭২.৬	৭৩.০	৭৩.০	৭১.৭	৭১.০	৭১.৫	৭০.৮	৬৯.৭	৬৭.৭		
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘন্টা)	৫৫.৫	৫৪.৫	৫৪.৫	৫৫.৫	৫৪.০	৫১.৫	৫২.৫	৪৬.৫	৪৫.৫	৪১.৫	৩২.০	২৬.৫	২৬.০	২৪.৫	২৯.০	২৫.০	২৯.৫	৩২.৫	৩০.০	২৮.০	৩০.৫	৩২.৫	৩১.৫	৩৩.০	৩২.৫	৩৮.৫		
ধাপ সমূহ																													
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ				অঙ্গজ বৃদ্ধি				ফুল ও ফল										ফসল কাটা										
পোকাকার জীবন চক্র																													
					ডিম (৬ থেকে ১৫ দিন)				কীড়া (১৩ থেকে ২৫ দিন)				পুত্রলি (৭ থেকে ২০ দিন)				প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)				প্রাপ্তবয়স্ক (ক্ষতিগ্রস্ত ফুল এবং অপরিপক্ক ফল)								