

খরিফ চীনাবাদামের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ: রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ), বাংলাদেশ।

অঞ্চলঃ রাজশাহী	খরিফ চীনাবাদাম									জীবনকালঃ ১২০-১৩০ দিন								
	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
মাসসমূহ																		
প্রমানেসপ্তাহ (Std. week)	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	৪.০	৩.০	৪.০	১৪.০	১৩.০	১০.০	১৯.০	১৭.০	২৪.০	২৯.০	৩৩.০	৩৬.০	৩৪.০	৪৮.০	৫১.০	৭৮.০	৭২.০	৬৬.০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	৩২.১	৩৩.১	৩৪.৬	৩৫.০	৩৬.১	৩৬.৭	৩৬.৪	৩৫.৯	৩৫.৪	৩৫.৩	৩৫.১	৩৫.০	৩৫.৩	৩৫.০	৩৩.৯	৩৩.১	৩৩.০	৩২.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১৬.৪	১৭.৬	১৯.৪	২০.৬	২২.১	২৩.০	২৩.৪	২৩.৯	২৩.৭	২৪.৩	২৪.৬	২৫.০	২৫.৪	২৫.৯	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০
গড় তাপমাত্রা (°সে.)	২৪.৩	২৫.৪	২৭.০	২৭.৮	২৯.১	২৯.৯	২৯.৯	২৯.৯	২৯.৬	২৯.৮	২৯.৯	৩০.০	৩০.৪	৩০.৫	৩০.০	২৯.৬	২৯.৫	২৯.৪
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৯০.৩	৮৮.৭	৮৮.৩	৮৯.১	৮৮.৯	৮৯.০	৯০.১	৯০.৭	৯২.১	৯২.৭	৯৩.৩	৯৩.১	৯৩.৭	৯৪.৬	৯৫.৪	৯৬.১	৯৬.৬	৯৬.৬
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৩২.৭	৩০.৪	৩০.৪	৩৫.৯	৩৪.৩	৩৪.৬	৪১.৪	৪৫.১	৫০.০	৫১.৯	৫৫.৬	৫৮.৩	৫৮.৯	৬২.৬	৬৭.৯	৭১.১	৭৩.৪	৭৩.৭
গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৬১.৫	৫৯.৪	৫৯.৪	৬২.৫	৬১.৬	৬১.৮	৬৫.৮	৬৭.৯	৭১.১	৭২.৩	৭৪.৫	৭৫.৭	৭৬.৩	৭৮.৬	৮১.৭	৮৩.৬	৮৫.০	৮৫.২
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৯.০	৫৯.০	৫৯.০	৫২.০	৫৭.০	৫৭.০	৫৭.০	৫৬.০	৫২.০	৫৩.০	৫৪.০	৪৮.০	৫১.০	৪৮.০	৩৫.০	৩১.০	৩১.০	৩০.০
বাতাসের দিক (ডিগ্রী)	২২০	২১৪	২০৮	১৮৬	১৮৫	১৮৫	২৬৭	১৪৭	১৩৬	১৩৬	১৩৫	১২৬	১৩৩	১৩৯	১২৯	১২৭	১৩২	১৪১
বাতাসের গতি (কি.মি./ঘণ্টা)	৫.৪	৫.৪	৫.৬	৫.৬	৬.১	৬.১	৮.২	৭.৪	৭.৪	৭.২	৭.২	৭.২	৭.২	৬.৭	৬.৭	৬.৮	৬.৮	৫.৭
ধাপসমূহ																		
	অংকুরোদগম	অঙ্গজ বৃদ্ধি			ফুল আসা			ফল আসা			পরিপক্বতা থেকে কর্তন							

অনুকূল আবহাওয়া					
তাপমাত্রা (°সে.)	>১৪° সেন্টিগ্রেড	২২-২৮° সেন্টিগ্রেড	২৪-৩৪° সেন্টিগ্রেড	২৪-৩৪° সেন্টিগ্রেড	২৪-৩৪° সেন্টিগ্রেড
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৫০-৮৫%				
মাটির তাপমাত্রা (°সে.)	২১-৩০° সেন্টিগ্রেড	২১-৩০° সেন্টিগ্রেড	২১-৩০° সেন্টিগ্রেড	২১-৩০° সেন্টিগ্রেড	২১-৩০° সেন্টিগ্রেড
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	৫০০-৭০০ মি.মি				
সূর্যালোক	পর্যাপ্ত সূর্যালোক				
স্বাভাবিক খাপভিত্তিক প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ (মি.মি.)	১৫০ মি.মি	১৫০-৪০০ মি.মি	৪০০-৫০০ মি.মি	৪০০-৫০০ মি.মি	৪০০-৫০০ মি.মি

রোগ-বাহাইয়ের প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত আবহাওয়া				
পাতায় দাগ/টিক্সা রোগ	তাপমাত্রা ১৮-৩৫ ° সে., বৃষ্টিপাত কমপক্ষে ৬০ মি.মি.			
রাস্ট বা মরিচা রোগ	তাপমাত্রা ২০-২৬ ° সে., আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫% এর উপরে এবং সপ্তাহে ০৩ দিন বৃষ্টিপাত।			
গোড়া পঁচা/কান্ড পঁচা রোগ	তাপমাত্রা ২০-২৫° সে., আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫% এর উপরে এবং ভারি বৃষ্টিপাত।			
বাত নেক্রোসিস ভাইরাস	শুক্ক এবং মাঝারী উচ্চ তাপমাত্রা (১৬-২৮° সে.), বৃষ্টিপাত ৩০ মি.মি. (পোষকের জন্য)			
বিছা পোকা	উষ্ণ এবং আর্দ্র আবহাওয়া।			
জ্যাসিড/পাতা শোষণ পোকা	শুক্ক এবং উষ্ণ আবহাওয়া (৩০-৩৮° সেন্টিগ্রেড)।			
ত্রিপস	শুক্ক এবং মাঝারী উচ্চ তাপমাত্রা (১৬-২৮° সে.), বৃষ্টিপাত ৩০ মি.মি.।			
উই পোকা	তাপমাত্রা ২৪-৩৪ ° সে., বেলে-দোআঁশ মাটি।			

আবহাওয়া সর্ভকর্বার্ণ				
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	>১০০ মি.মি./দিন	>১০০ মি.মি./দিন	>৫০ মি.মি./দিন	
ভেজা থাকার সময় কাল	১০ দিনের জন্য >৩০ মি.মি.	১০ দিনের জন্য >৩০ মি.মি.	১০ দিনের জন্য >৩০ মি.মি.	
মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া			মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া	
খরা	১৫ দিন	১৫ দিন		
প্রবল বাতাস	২৮ কি.মি./ঘণ্টা	২২ কি.মি./ঘণ্টা	২৫ কি.মি./ঘণ্টা	
শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি	শিলাবৃষ্টি	
তাপমাত্রা (°সে.)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (<১৪° সে. এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা >৩৪° সে.)			