পেয়ারার ক্যাঙ্কার রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ:রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ,নওগা,নাটোর), বাংলাদেশ ।

	অঞ্চলঃ রাজশাহী	পেয়ারা																		সময়কালঃ ১৪০ দিন	
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	জানু পৌষ-মাঘ)	ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)			মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)			এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)			মে (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য)								জুন(জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়)	
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>৩৪° সে																			
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	>১৮° সে																			
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৮৮%																			
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৩২%																			
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ১০ মি.মি																			
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	৪.০	৩.০	২.০	৩.০	৫.০	৪.০	৩.০	৪.০	১৪.০	১৩.০	১০.০	১৯.০	১৭.০	২৪.০	২৯.০	৩৩.০	৩৬.০	৩৪.০	৪৮.০	৫১.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২৫.৬	২৬.৭	২৮.১	২৯.৩	৩০.৪	৩২.১	৩৩.১	৩৪.৬	৩৫.০	৩৬.১	৩৬.৭	৩৬.৪	৩৫.৯	৩৫.৪	৩৫.৩	৩৫.১	৩৫.০	৩৫.৩	৩৫.০	৩৩.৯
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১২.০	১২.৩	১৩.৬	১৪.১	১৫.১	১৬.৪	১৭.৬	১৯.৪	২০.৬	২২.১	২৩.০	২৩.৪	২৩.৯	২৩.৭	২৪.৩	২৪.৬	২৫.০	২৫.৪	২৫.৯	২৬.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৫.৩	৯৪.০	৯৩.৯	৯২.০	৯১.৬	৯০.৩	৮৮.৭	৮৮.৩	৮৯.১	৮৮.৯	৮৯.০	৯০.১	৯০.৭	৯২.১	৯২.৭	৯৩.৩	৯৩.১	৯৩.৭	৯৪.৬	৯৫.৪
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৪৪.৭	৪২.০	৪০.৩	৩৬.৬	৩৪.৬	৩২.৭	৩০.৪	৩০.৪	৩৫.৯	৩৪.৩	৩৪.৬	৪১.৪	৪৫.১	৫০.০	৫১.৯	৫৫.৬	৫৮.৩	৫৮.৯	৬২.৬	৬৭.৯
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৫১.০	৫৫.০	৫৬.০	৫৮.০	৫৯.০	৫৯.০	৫৯.০	৫৯.০	৫২.০	৫৭.০	৫৭.০	৫৭.০	৫৬.০	৫২.০	৫৩.০	৫৪.০	৪৮.০	৫১.০	৪৮.০	৩৫.০
ধাপসমূহ		ফুলের কুড়ি বের হওয়া		ফুলের কুড়ি দৃশ্যমান হওয়া		ফুলের প্রস্ফুটন			ফল ধারণ			ফলের বৃদ্ধি						ফল পরিপক্ক হওয়া			
												ক্যাঙ্কার									