কাঁঠালের গামোসিস রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রাজশাহী (জেলাসমূহ:রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ,নওগা,নাটোর), বাংলাদেশ ।

	অঞ্চলঃ রাজশাহী	কাঁঠাল																					সময়কালঃ ২২৪-২৩০দিন							
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	ডিসেম্বর((অগ্রাহন-পৌষ)				জানুয়ারী(পৌষ-মাঘ)				ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)				মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)				এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)				মে (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য)				জুন(জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়)				জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ)			
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>২৪°সে																											
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	>১১°সে																											
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৯০ %																											
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৩৮ %																											
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ৩ মি.মি																											
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	২১	২০	১৯	১৮	১	১	২	১	৪	৩	২	৩	৫	৪	৩	৪	১৪	১৩	১০	১৯	১৭	২৪	২৯	৩৩	৩৬	৩৪	৪৮	৫১	৭৮	৭২
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২৭.০	২৬.০	২৫.৪	২৪.৪	২৪.০	২৩.৯	২৪.০	২৪.৯	২৫.৬	২৬.৭	২৮.১	২৯.৩	৩০.৪	৩২.১	৩৩.১	৩৪.৬	৩৫.০	৩৬.১	৩৬.৭	৩৬.৪	৩৫.৯	৩৫.৪	৩৫.৩	৩৫.১	৩৫.০	৩৫.৩	৩৫.০	৩৩.৯	৩৩.১	৩৩.০
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১৪.০	১৩.১	১২.৪	১১.৬	১১.০	১০.৯	১০.৯	১০.৯	১২.০	১২.৩	১৩.৬	১৪.১	১৫.১	১৬.৪	১৭.৬	১৯.৪	২০.৬	২২.১	২৩.০	২৩.৪	২৩.৯	২৩.৭	২৪.৩	২৪.৬	২৫.০	২৫.৪	২৫.৯	২৬.০	২৬.০	২৬.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৪.৭	৯৫.৯	৯৫.৩	৯৫.৭	৯৫.৬	৯৫.১	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৪.০	৯৩.৯	৯২.০	৯১.৬	৯০.৩	৮৮.৭	৮৮.৩	৮৯.১	৮৮.৯	৮৯.০	৯০.১	৯০.৭	৯২.১	৯২.৭	৯৩.৩	৯৩.১	৯৩.৭	৯৪.৬	৯৫.৪	৯৬.১	৯৬.৬
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৪৬.৯	৫০.১	৫০.০	৫০.০	৫০.১	৪৮.৪	৪৭.৯	৪৫.৭	৪৪.৭	৪২.০	৪০.৩	৩৬.৬	৩৪.৬	৩২.৭	৩০.৪	৩০.৪	৩৫.৯	৩৪.৩	৩৪.৬	৪১.৪	৪৫.১	৫০.০	৫১.৯	৫৫.৬	৫৮.৩	৫৮.৯	৬২.৬	৬৭.৯	৭১.১	৭৩.৪
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৫১.০	৪৭.০	৪৬.০	৪৪.০	৪২.০	৪২.০	৪৬.০	৫২.০	৫১.০	৫৫.০	৫৬.০	৫৮.০	৫৯.০	৫৯.০	৫৯.০	৫৯.০	৫২.০	৫৭.০	৫৭.০	৫৭.০	৫৬.০	৫২.০	৫৩.০	৫৪.০	৪৮.০	৫১.০	৪৮.০	৩৫.০	৩১.০	৩১.০
ধাপসমূহ		 পুষ্প মঞ্জুরী বের হওয়া				ফুল আসা				ফল বর্ধন														ফল পরিপক্ক হওয়া						
														গামোসিস																	