


আমের ডাই ব্যাক রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রংপুর (জেলাসমূহ:রংপুর,কুড়িগ্রাম,গাইবান্ধা,নীলফামারী,লালমনিরহাট), বাংলাদেশ ।

অঞ্চলঃ রংপুর		আম																				সময়কালঃ ১৬০-১৬৫দিন			
মাস	জানুয়ারী(পৌষ-মাঘ)	ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)					মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)					এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)					মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)					জুন(জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)		জুলাই(আষাঢ় শ্রাবণ)	
আবহাওয়া সতর্কতা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>৩৪° সে (১২তম সপ্তাহ)																							
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	< ১৮° সে (১২তম সপ্তাহ)																							
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৮৭% (১২তম সপ্তাহ)																							
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৪০% (১০ম সপ্তাহ)																							
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ৬ মি.মি.																							
	সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
বৃষ্টিপাত(মি.মি.)		৩	২	১	১	২	৪	২	৩	১	৩	৬	১৯	১১	২০	২৯	৩২	৫০	৪০	৬৫	৬২	৮৭	১০৭	৯১	১১০
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)		২২.৪	২৩.২	২৩.৪	২৪.৭	২৫.৯	২৬.৭	২৭.৫	২৮.৫	২৯.৯	৩০.৮	৩১.৬	৩১.৪	৩২.১	৩২.৫	৩২.৩	৩২.০	৩১.৯	৩২.৫	৩২.৭	৩২.২	৩২.৮	৩২.৭	৩২.৪	৩২.০
সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)		১০.৪	১০.৮	১০.৮	১১.৮	১২.৭	১৩.৭	১৪.৪	১৫.৩	১৬.১	১৭.৩	১৮.৪	১৯.৫	২০.৩	২১.১	২১.৯	২১.৯	২২.৩	২৩.২	২৩.৪	২৩.৯	২৪.৪	২৫.০	২৫.২	২৫.৮
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)		৯৬.০	৯৫.৮	৯৫.৭	৯৫.৫	৯৪.৩	৯৩.৭	৯২.৯	৯১.৪	৮৯.৮	৮৮.৭	৮৮.১	৮৭.৭	৮৮.৫	৮৮.৪	৮৯.৯	৯০.৯	৯২.৫	৯২.২	৯২.৯	৯২.৮	৯৩.৩	৯৩.৯	৯৪.২	৯৪.৯
সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)		৫৭.৮	৫৬.২	৫৪.২	৫১.৬	৪৮.০	৪৭.১	৪৫.৩	৪২.৮	৩৯.৬	৪০.৮	৪২.৫	৪৮.৮	৪৯.৭	৫০.৭	৫৬.৭	৫৯.০	৬২.০	৬২.০	৬২.৯	৬৫.৮	৬৬.৭	৬৯.০	৭০.৭	৭৩.৭
সূর্যালোকঘণ্টা(ঘন্টা)		৩৬.৫	৩৯.৫	৪১.০	৪৪.০	৪৮.৫	৫০.০	৫১.৫	৫৬.৫	৫৭.৫	৫৭.০	৫৪.০	৪৯.০	৫১.৫	৫১.০	৪৭.৫	৪৭.০	৪৬.৫	৪৭.৫	৪৯.০	৪১.০	৪০.৫	৩৮.০	৩১.৫	২৭.০
ধাপসমূহ																									
	শীর্ষকুড়ির স্ফীতি	মঞ্জরীর প্রসারণ	মঞ্জরীর বর্ধন ও ফুল আসা	মটরদানা পর্যায়	ফল বৃদ্ধি পর্যায়	ফল পরিপক্ব ও সংগ্রহ পর্যায়																			

