পেঁপের পাউডারী মিলডিউ রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রাজশাহী (জেলাসমূহ:রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ,নওগা,নাটোর), বাংলাদেশ ।

	অঞ্চলঃ রাজশাহী	পেঁপে																												সময়কালঃ ৩৬৫-৩৭৩ দিন
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)	মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)				এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)				মে (বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য)				জুন(জৈষ্ঠ্য-আষাঢ়)				জুলাই(আষাঢ়-শ্রাবণ)				আগষ্ট(শ্রাবণ-ভাদ্র)				সেপ্টম্বের (ভাদ্র-আশ্বিণ) -ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)						
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>৩৪°সে.																												
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)	>২৬°সে.																												
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৯৬ %																												
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	> ৭৪ %																												
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	> ৭৪ মি.মি																												
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	-১২
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	৪	১৪	১৩	১০	১৯	১৭	২৪	২৯	৩৩	৩৬	৩৪	৪৮	৫১	৭৮	৭২	৬৬	৭১	৭৫	৭২	৫২	৫৭	৬৪	৫৩	৫৭	৫৪	৫৯	৫২	৮৩	৪৪	৪
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	৩৪.৬	৩৫.০	৩৬.১	৩৬.৭	৩৬.৪	৩৫.৯	৩৫.৪	৩৫.৩	৩৫.১	৩৫.০	৩৫.৩	৩৫.০	৩৩.৯	৩৩.১	৩৩.০	৩২.৭	৩২.৯	৩২.৩	৩২.৬	৩২.৯	৩২.৯	৩২.৭	৩৩.০	৩৩.০	৩২.৯	৩৩.০	৩৩.০	৩২.৯	৩২.৭	৩৪.৬
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১৯.৪	২০.৬	২২.১	২৩.০	২৩.৪	২৩.৯	২৩.৭	২৪.৩	২৪.৬	২৫.০	২৫.৪	২৫.৯	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৩	২৫.০	১৯.৪
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৮৮.৩	৮৯.১	৮৮.৯	৮৯.০	৯০.১	৯০.৭	৯২.১	৯২.৭	৯৩.৩	৯৩.১	৯৩.৭	৯৪.৬	৯৫.৪	৯৬.১	৯৬.৬	৯৬.৬	৯৬.৯	৯৭.০	৯৬.৯	৯৬.৭	৯৬.৬	৯৬.৭	৯৬.১	৯৬.৪	৯৬.৩	৯৬.৭	৯৬.৩	৯৬.৭	৯৬.৩	৮৮.৩
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৩০.৪	৩৫.৯	৩৪.৩	৩৪.৬	৪১.৪	৪৫.১	৫০.০	৫১.৯	৫৫.৬	৫৮.৩	৫৮.৯	৬২.৬	৬৭.৯	৭১.১	৭৩.৪	৭৩.৭	৭৪.৩	৭৫.৩	৭৩.৯	৭২.৬	৭২.৬	৭৪.১	৭২.০	৭০.৯	৭১.৩	৭১.০	৬৯.৬	৬৮.৯	৬৭.৪	৩০.৪
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৫৯.০	৫২.০	৫৭.০	৫৭.০	৫৭.০	৫৬.০	৫২.০	৫৩.০	৫৪.০	৪৮.০	৫১.০	৪৮.০	৩৫.০	৩১.০	৩১.০	৩০.০	৩০.০	৩০.০	৩৪.০	৩৪.০	৩৬.০	৩৩.০	৩৪.০	৪০.০	৩৫.০	৩৮.০	৪০.০	৪৩.০	৪৬.০	৫৯.০
ধাপসমূহ		চারা তৈরি ও রোপন					অংগজবৃদ্ধি পর্যায়								ফুল আসা পর্যায়			ফল উৎপাদন ও সংগ্রহ													
																						পাউডারী মিলডিউ										