







লিচুর ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগের আবহাওয়া পঞ্চিকাঃ যশোর অঞ্চল (জেলাসমূহঃ যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ ।

অঞ্চলঃ যশোর	লিচু																								সময়কালঃ ১৬৮ দিন		
	জানুয়ারী (পৌষ-মাঘ)						ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)						মার্চ (ফাল্গুন-চৈত্র)						এপ্রিল (চৈত্র-বৈশাখ)						মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)		জুন (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)
আবহাওয়া সতর্কতা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)	>৩২° সে																									
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (° সে)	>১৮° সে																									
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	>৯২%																									
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	>৩৮%																									
	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	>১০ মি.মি.																									
	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	০.৫	১.৫	২.৫	৩.০	৬.৫	৫.০	৪.৫	৮.০	৪.০	২.৫	৪.৫	১১.৫	১২.০	১১.৫	৭.০	১২.৫	২১.৫	২৮.৫	৩০.৫	৩৬.০	৪৪.৫	৩৮.৫	৪৯.৫	৫৪.৫			
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে.)	২৪.৫	২৪.৫	২৫.১	২৫.৬	২৬.৬	২৭.৮	২৮.৯	৩০.০	৩১.০	৩২.৪	৩৩.৬	৩৪.৭	৩৪.৬	৩৫.৫	৩৬.১	৩৬.৫	৩৬.৩	৩৬.০	৩৬.০	৩৫.৯	৩৫.৫	৩৫.৬	৩৫.৩	৩৪.০			
সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (° সে.)	১০.৯	১০.৭	১১.০	১০.৮	১২.০	১৩.৩	১৪.৭	১৫.৬	১৬.৪	১৭.৭	১৯.০	২০.৮	২১.৮	২২.৮	২৩.৫	২৪.১	২৪.২	২৪.২	২৫.২	২৫.০	২৫.৫	২৬.০	২৬.২	২৬.২			
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৫.৪	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৪.৯	৯৪.৯	৯৪.২	৯৪.০	৯৩.৭	৯৩.২	৯২.৫	৯২.১	৯২.১	৯২.৪	৯২.৪	৯২.৯	৯২.৪	৯২.৩	৯২.৮	৯২.৭	৯৩.১	৯৩.৬	৯৪.০	৯৪.১	৯৪.৮			
সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪৯.৬	৪৭.৯	৪৭.০	৪৪.৭	৪৪.২	৪২.২	৪১.০	৩৯.৩	৩৬.৫	৩৫.৪	৩৪.৯	৩৬.৭	৪২.০	৪১.৫	৪১.৬	৪৪.৩	৪৬.৯	৪৯.৯	৫১.৭	৫৪.৮	৫৮.৭	৬০.০	৬২.১	৬৭.৫			
সূর্যালোকঘন্টা (ঘন্টা)	৪১.০	৪২.৫	৪৪.৫	৪৮.০	৪৭.৫	৪৯.৫	৫০.০	৫৪.৫	৫৫.০	৫৪.০	৫৫.০	৫৩.০	৫১.৫	৫৫.৫	৫৪.৫	৫৪.৫	৫৫.৫	৫৪.০	৫১.৫	৫২.৫	৪৬.৫	৪৫.৫	৪১.৫	৩২.০			
ধাপসমূহ																											
	ফুলের কুড়ি গঠন						পুষ্প মঞ্জুরী বের হওয়া			ফুল ও ফল ধারণ			ফলের বৃদ্ধি						ফল পরিপক্ব হওয়া ও সংগ্রহ								
রোগ																											
													ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া														