


লিচুর ফল পচা রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকাঃ রাজশাহী অঞ্চল (জেলাসমূহ:রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ,নওগা,নাটোর), বাংলাদেশ ।

অঞ্চলঃ রাজশাহী	লিচু																								সময়কালঃ ১৬৮দিন		
	জানুয়ারী(পৌষ-মাঘ)						ফেব্রুয়ারী (মাঘ-ফাল্গুন)						মার্চ(ফাল্গুন-চৈত্র)						এপ্রিল(চৈত্র-বৈশাখ)						মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)		জুন(জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস																										
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (° সে)																									>৩৪ °সে	
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে)																									>২৪ °সে	
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)																									>৯২.৫%	
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)																									>৫২%	
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)																									>৩০ মি.মি	
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমাণসপ্তাহ (Std. week)	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
	বৃষ্টিপাত(মি.মি.)	১.০	১.০	২.০	১.০	৪.০	৩.০	২.০	৩.০	৫.০	৪.০	৩.০	৪.০	১৪.০	১৩.০	১০.০	১৯.০	১৭.০	২৪.০	২৯.০	৩৩.০	৩৬.০	৩৪.০	৪৮.০	৫১.০		
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে.)	২৪.০	২৩.৯	২৪.০	২৪.৯	২৫.৬	২৬.৭	২৮.১	২৯.৩	৩০.৪	৩২.১	৩৩.১	৩৪.৬	৩৫.০	৩৬.১	৩৬.৭	৩৬.৪	৩৫.৯	৩৫.৪	৩৫.৩	৩৫.১	৩৫.০	৩৫.৩	৩৫.০	৩৩.৯		
	সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা (°সে.)	১১.০	১০.৯	১০.৯	১০.৯	১২.০	১২.৩	১৩.৬	১৪.১	১৫.১	১৬.৪	১৭.৬	১৯.৪	২০.৬	২২.১	২৩.০	২৩.৪	২৩.৯	২৩.৭	২৪.৩	২৪.৬	২৫.০	২৫.৪	২৫.৯	২৬.০		
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৯৫.৬	৯৫.১	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৪.০	৯৩.৯	৯২.০	৯১.৬	৯০.৩	৮৮.৭	৮৮.৩	৮৯.১	৮৮.৯	৮৯.০	৯০.১	৯০.৭	৯২.১	৯২.৭	৯৩.৩	৯৩.১	৯৩.৭	৯৪.৬	৯৫.৪		
	সর্বোনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা(%)	৫০.১	৪৮.৪	৪৭.৯	৪৫.৭	৪৪.৭	৪২.০	৪০.৩	৩৬.৬	৩৪.৬	৩২.৭	৩০.৪	৩০.৪	৩৫.৯	৩৪.৩	৩৪.৬	৪১.৪	৪৫.১	৫০.০	৫১.৯	৫৫.৬	৫৮.৩	৫৮.৯	৬২.৬	৬৭.৯		
	সূর্যালোকঘন্টা(ঘন্টা)	৪২.০	৪২.০	৪৬.০	৫২.০	৫১.০	৫৫.০	৫৬.০	৫৮.০	৫৯.০	৫৯.০	৫৯.০	৫৯.০	৫২.০	৫৭.০	৫৭.০	৫৭.০	৫৬.০	৫২.০	৫৩.০	৫৪.০	৪৮.০	৫১.০	৪৮.০	৩৫.০		
	ধাপসমূহ																										
ফুলের কুড়ি গঠন						পুষ্প মঞ্জুরী বের হওয়া						ফুল ও ফল ধারণ						ফলের বৃদ্ধি						ফল পরিপক্ব হওয়া ও সংগ্রহ			
রোগ	