










রবি মৌসুমের রোগের পোকাকার আবহাওয়ার পঞ্জিকা-টমেটো (আর্লি ব্লাইট): কুমিল্লা অঞ্চল (জেলা: কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া)বাংলাদেশ

অঞ্চলঃ কুমিল্লা		রবি মৌসুমঃ -টমেটো (আর্লি ব্লাইট)																সময়কালঃ ১২০-১৫০ দিন				
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	সেপ্টেম্বর				অক্টোবর				নভেম্বর				ডিসেম্বর		জানুয়ারি						
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	মাটির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮, গ্রীষ্মকালে লম্বা হয় ও শীতকালে ছোট হয়																				
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	মাটির তাপমাত্রা ১৬																				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯০%																				
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭০%																				
	বৃষ্টিপাত (মিমি)																					
সাপ্তাহিক ষাভাবিক আবহাওয়া	প্রধান সপ্তাহ	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	০১	০২	০৩	০৪
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৫৩	৬৬.৫	৬৮	৫৩	৫১	৪৬.৫	৩০.৫	১৬	১১.৫	১৮	৮.৫	৪	২.৫	০	৪.৫	১	১.৫	০	০	০	১.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩২.৮	৩২	৩২	৩২	৩২.৩	৩১.৯	৩১.৮	৩১.২	৩১	৩০.৫	২৯.৮	২৯	২৮.২	২৭.৭	২৬.৫	২৫.৮	২৫.৪	২৪.৭	২৪.৫	২৫	২৫.৪
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৫.৭	২৫.৬	২৫.৬	২৫.৬	২৫.৪	২৪.৭	২৪.৩	২২.৮	২১.৮	২১	১৯.৩	১৮.১	১৬.৯	১৫.৮	১৫	১৪.২	১৩.৮	১৩	১২.৭	১২.৭	১২.৬
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৫.২	৯৫.৪	৯৫.৪	৯৫.৬	৯৫.৬	৯৫.৫	৯৫.৫	৯৫.২	৯৫.৩	৯৫.৬	৯৫.৩	৯৫.৪	৯৫.৮	৯৫.৮	৯৬.২	৯৬	৯৬	৯৬	৯৫.৫	৯৫.৩	৯৪.৪
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭৩.৫	৭৩.১	৭২.২	৭১.১	৭০.২	৬৮.১	৬৫.৮	৬১.৯	৬০.৬	৫৮.২	৫৪.৮	৫.৬	৫২.২	৫০.৬	৫১.৯	৫২.১	৫১.৩	৫১.৮	৫১.২	৪৯.১	৪৬.৪
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৩২	৩৩	৩৩.৫	৩৫	৩৯	৪৩	৪৪.৫	৫০.৫	৪৭	৪৯.৫	৫০	৫০.৫	৪৮.৫	৪৭.৫	৪২.৫	৪০.৫	৪০	৪০	৩৭	৪৩.৫	৪৭
	ধাপসমূহ																					
অঙ্কুরোদগম ও চারা				উদ্ভিদ্ধ বৃদ্ধি								ফ্লাওয়ারিং এবং ফ্রুটিং				ফসল কাটা						
রোগের জীবন চক্র																						
	নিমন্ত্রণকর্তা সাথে সংযুক্ত বীজগুটি				নিমন্ত্রণকর্তা সাথে সংযুক্ত বীজগুটি				জীবাণু নল গঠন এবং অনুপ্রবেশ				রোগের বিকাশ				রোগের সংঘটনের পর, চত্রটিফল ও ফসল তোলার পর্যায় পর্যন্ত চলতে থাকে।					