রবি মৌসুমে উৎপাদিত রসুন ফসলের রোগের আবহাওয়া পঞ্জিকা (বাইট রোগ)ঃ বগুড়া অঞ্চল (জেলা: পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট), বাংলাদেশ

অঞ্চল ঃ বগুড়া	রবি মৌসুমের রসুনঃ (বাইট রোগ)																					সময়কাল ঃ ১৪০-১৫০ দিন
আবহাওয়া সর্তকতা	মাস	নভেম্বর					ডিসেম্বর				জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি							মার্চ
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঃ)	২৮°সেঃ																				
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৬°সেঃ																				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯০%বা এর ওপর; ২৪ ঘন্টার বেশি ভেজা থাকলে বা কমপক্ষে ৬ ঘন্টা ভেজা থাকলে রোগ সৃষ্টি হয়																				
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৮৫%																				
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	মাঠে ফসল থাকার সময় মেঘাচ্ছন্ন বা বৃষ্টি প্রবণ আবহাওয়া																				
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রমানসপ্তাহ	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৫.০	৫.০	০.০	০.০	৩.০	০.০	৩.০	০.০	৪.০	০.০	২.০	২.০	১.০	১.০	১.০	৪.০	৩.০	৫.০	২.০	৪.০	৩.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩১.০	৩০.৭	৩০.১	২৯.৭	২৮.৯	২৭.৭	২৬.৩	২৫.০	২৫.৭	২৪.০	২৪.০	২৪.৩	২৫.৪	২৫.৯	২৬.৯	২৭.৭	২৮.৬	২৯.৩	৩০.৯	৩১.৯	৩২.৯
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২১.০	১৯.৯	১৮.৩	১৭.৩	১৫.৭	১৫.০	১৪.১	১২.০	১৩.৪	১২.০	১১.৪	১১.৪	১২.০	১২.৯	১৩.৬	১৪.৬	১৫.৪	১৬.৪	১৭.৪	১৮.৩	২০.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৪.৩	৯৪.৬	৯৪.১	৯৩.৯	৯৩.৯	৯৩.৭	৯৪.৬	৯৪.৩	৯৪.৬	৯৪.১	৯৪.৩	৯৪.৩	৯৩.৯	৯৩.১	৯২.১	৯১.৪	৯০.৪	৮৮.৭	৮৯.১	৮৬.৪	৮৬.৩
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৫.৬	৫২.৪	৪৯.৯	৪৮.৩	৪৭.০	৪৮.১	৫০.৬	৫০.৬	৫০.০	৫০.৯	৪৯.০	৪৭.৭	৪৬.০	৪৪.৯	৪১.৪	৪০.৩	৩৯.১	৩৮.০	৩৬.৯	৩৭.১	৩৯.১
	সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	৫২.০	৫৫.০	৫৫.০	৫৬	৫৬	৫৪	৪৮	৪৯.০	৪৬.০	৪৪.০	৪৪.০	৪৬.০	৫০.০	৫০.০	৫২.০	৫৩.০	৫৬.০	৬০.০	৫৯.০	৬১.০	৫৮.০
ধাপ সমূহ																						
		অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ				উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধি					ফুল এবং ফল						ফসল কাটা					
রোগের জীবন চক্র																					
		হোস্টের সাথে স্পোর অ্যাসোসিয়েশন	স্পোর অঙ্কুরোদগম	জীবাণু গঠন এবং অনুপ্রবেশ		রোগ উন্নয়ন	রোগ সংঘটিত হওয়ার পর রোগের চক্র লবঙ্গ গঠনের পর্যায় পর্যন্তচলতে থাকে															