













রবি মৌসুমে উৎপাদিত রসুন ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (থ্রিপস পোকা)ঃ বগুড়া অঞ্চল (জেলা: পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট), বাংলাদেশ

অঞ্চল : বগুড়া		রবি মৌসুমের রসুনঃ থ্রিপস পোকা																সময়কাল : ১৪০-১৫০ দিন				
আবহাওয়া সূচকতা	মাস	নভেম্বর				ডিসেম্বর				জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩০.৮৪°সেঃ, উষ্ণ এবং শুষ্ক আবহাওয়ায় থ্রিপস সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা বৃষ্টিপাতের অভাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত																				
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৭.৫°সেঃ, শীতকালে বা নিম্ন তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে বিকাশ পায়																				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭৮.৬২%, উচ্চ আদ্রতা থ্রিপসের সংখ্যা কমায়																				
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪৭.৬%, নিম্ন আদ্রতার সাথে উচ্চ তাপমাত্রার পোকাকার জীবনকাল কম হয়																				
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	উচ্চ বৃষ্টিপাত পোকাকার সংখ্যা কমায়																				
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসত্তাহ	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৫.০	৫.০	০.০	০.০	৩.০	০.০	৩.০	০.০	৪.০	০.০	২.০	২.০	১.০	১.০	১.০	৪.০	৩.০	৫.০	২.০	৪.০	৩.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩১.০	৩০.০	৩০.০	২৯.০	২৮.৯	২৭.৭	২৬.৩	২৫.০	২৫.৭	২৪.০	২৪.০	২৪.৩	২৫.৪	২৫.৯	২৬.৯	২৭.৭	২৮.০	২৯.৩	৩০.৯	৩১.৯	৩২.৯
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২১.০	১৯.৯	১৮.০	১৭.০	১৫.৭	১৫.০	১৪.১	১২.০	১৩.৪	১২.০	১১.৪	১১.৪	১২.০	১২.৯	১৩.৬	১৪.৬	১৫.৪	১৬.৪	১৭.৪	১৮.৩	২০.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৪.৩	৯৪.৬	৯৪.১	৯৩.০	৯৩.৯	৯৩.৭	৯৪.৬	৯৪.৩	৯৪.৬	৯৪.১	৯৪.৩	৯৪.৩	৯৩.৯	৯৩.১	৯২.১	৯১.৪	৯০.৪	৮৮.৭	৮৯.১	৮৬.৮	৮৬.৩
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৫.৬	৫২.৪	৪৯.৯	৪৮.৩	৪৭.০	৪৮.১	৫০.৬	৫০.৬	৫০.০	৫০.৯	৪৯.০	৪৭.৭	৪৬.০	৪৪.৯	৪১.৪	৪০.৩	৩৯.১	৩৮.০	৩৬.৯	৩৭.১	৩৯.১
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫২.০	৫৫.০	৫৫.০	৫৬.০	৫৬.০	৫৪.০	৪৮.০	৪৯.০	৪৬.০	৪৪.০	৪৪.০	৪৬.০	৫০.০	৫০.০	৫২.০	৫৩.০	৫৬.০	৬০.০	৫৯.০	৬১.০	৫৮.০
ধাপ সমূহ																						
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		উদ্ভিদ্ধ বৃদ্ধি				ফুল এবং ফল				ফসল কাটা											
পোকাকার জীবন চক্র																						
	ডিম (২ থেকে ৬ দিন)	কীড়া (৫ থেকে ৭ দিন)	পুতুলি (৩ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (২৮ থেকে ৩০ দিন)	ডিম (২ থেকে ৬ দিন)	কীড়া (৫ থেকে ৭ দিন)	পুতুলি (৩ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (২৮ থেকে ৩০ দিন)												