রবি মৌসুমে উৎপাদিত রসুন ফসলের পোকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (থ্রিপস পোকা)ঃ রংপুর অঞ্চল (জেলাঃ রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা) বাংলাদেশ

অঞ্চল ঃ রংপুর	রবি মৌসুমের রসুনঃ (থ্রিপস পোকা)				সময়কাল ঃ ১৪০-১৫০ দিন
আবহাওয়া	**মাস**	**নভেম্বর**	**ডিসেম্বর**	**জানুয়ারি**	**ফেব্রুয়ারি**	**মার্চ**
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঃ)	৩০.৮৪°সেঃ, উষ্ণ এবং শুষ্ক আবহাওয়ায় থ্রিপস সংখ্যা বৃদ্ধি পায় যা বৃষ্টিপাতের অভাবের সাথে সম্পর্কযুক্ত				
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৭.৫°সেঃ, শীতকালে বা নিম্ন তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে বিকাশ পায়				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭৮.৬২%, উচ্চ আর্দ্রতা থ্রিপসের সংখ্যা কমায়				
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪৭.৬%, নিম্ন আদ্রতার সাথে উচ্চ তাপমাত্রার পোকার জীবনকাল কম হয়				
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	উচ্চ বৃষ্টিপাত পোকার সংখ্যা কমায়				

সাপ্তাহিক স্বাভাবিক	প্রমানসপ্তাহ	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৪.০	৩.০	২.০	০.০	১.০	০.০	২.৫	০.০	২.৫	১.০	২.৫	২.০	১.০	১.০	১.৫	৩.৫	১.৫	২.৫	১.০	২.৫	৫.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩০.০	২৯.৮	২৯.০	২৮.৩	২৭.৭	২৬.৭	২৫.১	২৪.৭	২৪.১	২২.৭	২২.৪	২৩.২	২৩.৪	২৪.৭	২৫.৯	২৬.৭	২৭.৫	২৮.৫	২৯.৯	৩০.৮	৩১.৬
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২০.০	১৯.০	১৭.৫	১৬.৪	১৫.০	১৪.২	১৩.৫	১২.৫	১১.৫	১০.৯	১০.৪	১০.৮	১০.৮	১১.৮	১২.৭	১৩.৭	১৪.৪	১৫.৩	১৬.১	১৭.৩	১৮.৪
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৪.৫	৯৪.৪	৯৪.৬	৯৪.৯	৯৪.৯	৯৫.০	৯৫.৪	৯৫.৮	৯৬.১	৯৬.০	৯৬.০	৯৫.৮	৯৫.৭	৯৫.৫	৯৪.৩	৯৩.৭	৯২.৯	৯১.৪	৮৯.৮	৮৮.৭	৮৮.১
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৮.৭	৫৫.৯	৫৪.০	৫০.৯	৫০.৬	৫৩.৫	৫৬.২	৫৬.২	৫৫.২	৫৮.৫	৫৭.৮	৫৬.২	৫৪.২	৫১.৬	৪৮.০	৪৭.১	৪৫.৩	৪২.৮	৩৯.৬	৪০.৮	৪২.৫
	সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	৫৫.৫	৫৫.০	৫২.০	৫৪.০	৫৩.০	৪৯.৫	৪১.৫	৪২.৫	৪০.০	৩৬.০	৩৬.৫	৩৯.৫	৪১.০	৪৪.০	৪৮.৫	৫০.০	৫১.৫	৫৬.৫	৫৭.৫	৫৭.০	৫৪.০

ধাপ সমূহ				
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ	উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধি	ফুল এবং ফল	ফসল কাটা

পোকার জীবন চক্র								
		ডিম (২ থেকে ৬ দিন)	কীড়া (৫ থেকে ৭ দিন)	পুত্তলি (৩ থেকে ১০ দিন)	পূর্ণাঙ্গ (২৮ থেকে ৩০ দিন)	ডিম (২ থেকে ৬ দিন)	কীড়া (৫ থেকে ৭ দিন)	পুত্তলি (৩ থেকে ১০ দিন)	পূর্ণাঙ্গ (২৮ থেকে ৩০ দিন)