















রবি মৌসুমের মরিচ ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফল ছিদ্রকারী পোকা): দিনাজপুর অঞ্চল (জেলা:রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগা, নাটোর) বাংলাদেশ

অঞ্চল : দিনাজপুর		রবি মৌসুমের মরিচঃ (ফল ছিদ্রকারী পোকা)										সময়কাল : ১৫০-১৬০ দিন										
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	ডিসেম্বর			জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি			মার্চ			এপ্রিল								
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঃ)	সমস্ত পর্যায়ের জন্য সর্বোচ্চ প্রান্তিক তাপমাত্রা হল ৩৭°সেঃ, এবং ৪০°সেঃ প্রাণনাশক; ডিম, কীড়া, পুতলি- এর বিকাশের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা প্রায় ২৪-২৭°সেঃ																				
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	সর্বনিম্ন প্রান্তিক তাপমাত্রা হলো প্রায় ১০-১২°সেঃ																				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	প্রায় ৮৫%																				
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	<৩৫%																				
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাতের সাথে নেতিবাচক অনুবন্ধ																				
সাপ্তাহিক ষাড়াবিক আবহাওয়া	প্রধানসংস্থা	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০	৩.০	০.০	৪.০	২.০	২.০	৩.০	২.০	১.০	২.০	৩.০	১.০	১.০	১.০	৪.০	২.০	৭.০	৮.০	৮.০	২৫.০	২৩.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৭.০	২৫.৪	২৪.৯	২৩.৯	২২.৬	২২.৪	২৩.০	২৩.৭	২৫.০	২৫.৯	২৬.৭	২৭.৭	২৮.৬	৩০.১	৩১.১	৩২.০	৩২.১	৩৩.০	৩৩.৪	৩৩.০	৩২.৪
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৩.৩	১২.৯	১২.০	১০.৯	১০.৭	১০.৩	১০.০	১০.৬	১১.১	১২.১	১৩.৬	১৪.১	১৫.০	১৬.১	১৭.১	১৮.৬	১৯.৭	২০.৪	২১.১	২২.০	২২.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৬.১	৯৬.৪	৯৬.৩	৯৬.৬	৯৬.৭	৯৬.৩	৯৬.৪	৯৫.৯	৯৪.৭	৯৪.০	৯৩.৪	৯২.০	৯০.৬	৮৮.৯	৮৭.৬	৮৬.০	৮৭.১	৮৬.৬	৮৭.৪	৮৯.৪	৯১.১
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪৯.০	৫২.৯	৫২.৭	৫৪.০	৫৫.১	৫৩.৭	৫২.৪	৫০.৪	৪৭.৭	৪৩.১	৪২.৪	৪০.৯	৩৮.৪	৩৫.৩	৩৫.১	৩৬.৪	৪৩.৩	৪০.৯	৪৩.৪	৫০.৯	৫৩.৭
	সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	৪৮.০	৪২.০	৪১.০	৩৭.০	৩৪.০	৩৪.০	৩৭.০	৪১.০	৪৪.০	৪৬.০	৫২.০	৫৪.০	৫৭.০	৫৯.০	৫৯.০	৫৫.০	৪৯.০	৫২.০	৫৫.০	৪৯.০	৫০.০
ধাপ সমূহ																						
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		উদ্ভিঞ্জ বৃদ্ধি				ফুল এবং ফল				ফসল কাটা											
পোকাকার জীবন চক্র																						
			ডিম (২ থেকে ৪ দিন)		লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুতলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)		ডিম (২ থেকে ৪ দিন)		লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুতলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)					

খরিফ মৌসুমের মরিচ ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফল ছিদ্রকারী পোকা): দিনাজপুর অঞ্চল (জেলা:রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগা, নাটোর) বাংলাদেশ

অঞ্চল : দিনাজপুর	খরিফ মৌসুমের মরিচঃ (ফল ছিদ্রকারী পোকা)	সময়কাল : ১৫০-১৬০ দিন
------------------	--	-----------------------

আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	এপ্রিল				মে				জুন				জুলাই				আগস্ট						
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঃ)	সমস্ত পর্যায়ের জন্য সর্বোচ্চ প্রান্তিক তাপমাত্রা হল ৩৭°সেঃ, এবং ৪০°সেঃ প্রাণনাশক; ডিম, কীড়া, পুতলি- এর বিকাশের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা প্রায় ২৪-২৭°সেঃ																						
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	সর্বনিম্ন প্রান্তিক তাপমাত্রা হলো প্রায় ১০-১২°সেঃ																							
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	প্রায় ৮৫%																							
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	<৩৫%																							
বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাতের সাথে নেতিবাচক অনুবন্ধ																							
প্রধানসঞ্জাহ	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫		
বৃষ্টিপাত (মিমি)	৮.০	৮.০	২৫.০	২৩.০	৩১.০	৩৬.০	৫৭.০	৫৫.০	৭৩.০	৫৭.০	৭৭.০	১১১.০	৯৬.০	১০৯.০	১০৫.০	৮১.০	৮৪.০	৭০.০	৬০.০	৯৩.০	১০৩.০	৭১.০		
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৩.০	৩৩.৪	৩৩.০	৩২.৪	৩২.৩	৩২.৯	৩৩.০	৩৩.০	৩৩.৪	৩৩.৩	৩৩.০	৩২.৩	৩২.৪	৩২.০	৩২.১	৩২.১	৩২.৩	৩২.৯	৩২.৬	৩২.৪	৩২.১	৩২.৪		
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২০.৪	২১.১	২২.০	২২.০	২২.৩	২২.৯	২৩.৬	২৪.০	২৪.৪	২৫.০	২৫.১	২৫.৬	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.৩	২৬.৭	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০		
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৮৬.৬	৮৭.৪	৮৯.৪	৯১.১	৯২.৩	৯২.০	৯২.১	৯২.৪	৯২.৭	৯৩.৪	৯৩.৯	৯৪.৭	৯৪.৪	৯৫.১	৯৪.৬	৯৪.৪	৯৪.৭	৯৪.১	৯৪.০	৯৫.০	৯৫.৭	৯৫.৬		
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪০.৯	৪৩.৪	৫০.৯	৫৩.৭	৫৭.৬	৫৭.৩	৫৯.৩	৬২.৪	৬২.৩	৬৫.৪	৬৭.৭	৭১.৪	৭১.৬	৭৩.৩	৭২.৭	৭১.৯	৭১.৬	৭০.১	৭০.৯	৭২.৬	৭৩.১	৭১.৬		
সূর্যালোক ঘন্টা (ঘন্টা)	৫২.০	৫৫.০	৪৯.০	৫০.০	৪৯.০	৫১.০	৪৮.০	৪৪.০	৪২.০	৪০.০	৩৫.০	২৭.০	৩১.০	২৭.০	২৯.০	৩১.০	৩৬.০	৩৬.০	৩৭.০	৩৪.০	৩৪.০	৩৭.০		
ধাপ সমূহ																								
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ				উদ্ভিঞ্জ বৃদ্ধি				ফুল এবং ফল				ফসল কাটা											
পোকার জীবন চক্র																								
					ডিম (২ থেকে ৪ দিন)		লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুতলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)		ডিম (২ থেকে ৪ দিন)		লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুতলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)					