


















রবি মৌসুমের মরিচ ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফল ছিদ্রকারী পোকা): ফরিদপুর অঞ্চল (জেলা: ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী) বাংলাদেশ

অঞ্চল : ফরিদপুর		রবি মৌসুমের মরিচঃ (ফল ছিদ্রকারী পোকা)							সময়কাল : ১১০-১২০ দিন									
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি				মার্চ			এপ্রিল						
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঃ)	সমস্ত পর্যায়ের জন্য সর্বোচ্চ প্রান্তিক তাপমাত্রা হল ৩৭°সেঃ, এবং ৪০°সেঃ প্রাণনাশক; ডিম, কীড়া, পুতলি- এর বিকাশের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা প্রায় ২৪-২৭°সেঃ																
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	সর্বনিম্ন প্রান্তিক তাপমাত্রা হলো প্রায় ১০-১২°সেঃ																
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	প্রায় ৮৫%																
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	<৩৫%																
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাতের সাথে নেতিবাচক অনুবন্ধ																
সাপ্তাহিক ষাভাবিক আবহাওয়া	প্রমানসপ্তাহ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.৫	০.৫	০.৫	১.৫	৩.৫	৫.৫	৫.০	৭.৫	৫.০	৬.৫	৭.০	১২.৫	১৮.৫	২১.০	২০.৫	২৭.৫	৪১.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৪.৩	২৪.৪	২৪.৮	২৫.৪	২৬.৫	২৭.৪	২৮.৫	২৯.৫	৩০.৭	৩১.৮	৩২.৯	৩৩.৮	৩৩.৪	৩৪.২	৩৪.৮	৩৪.৫	৩৪.২
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১২.২	১২.০	১২.১	১২.১	১৩.১	১৩.৯	১৫.৫	১৬.০	১৭.৩	১৮.৫	১৯.৫	২১.২	২১.৮	২৩.০	২৩.৫	২৪.০	২৪.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৫.৭	৯৫.৪	৯৫.৫	৯৫.২	৯৪.৭	৯৪.৭	৬৪.১	৯৩.৮	৯৩.৪	৯২.৭	৯২.৪	৯২.৯	৯৩.২	৯৩.০	৯২.৯	৯২.৬	৯৩.৩
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫২.২	৫০.৯	৪৮.৯	৪৬.৩	৪৬.২	৪৩.৩	৪৩.৩	৪১.৫	৩৯.৫	৩৮.৮	৩৮.৪	৪২.১	৪৬.৭	৪৯.০	৫০.২	৫৩.৮	৫৬.৯
SShr (hrs)	৪১.৫	৩৯.৫	৪৪.৫	৫০.০	৪৯.০	৫২.০	৫২.০	৫৩.০	৫৪.৫	৫৩.০	৫৪.৫	৫১.৫	৫০.৫	৫২.৫	৫৩.০	৫৪.৫	৫২.৫	
ধাপ সমূহ																		
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		উদ্ভিদ্ধ বৃদ্ধি				ফুল এবং ফল				ফসল কাটা							
পোকাকার জীবন চক্র																		
	ডিম (২ থেকে ৪ দিন)		লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুতলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)		ডিম (২ থেকে ৪ দিন)		লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুতলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)			

খরিফ মৌসুমের মরিচ ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফল ছিদ্রকারী পোকা): ফরিদপুর অঞ্চল (জেলা: ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী) বাংলাদেশ

অঞ্চল : ফরিদপুর		খরিফ মৌসুমের মরিচঃ (ফল ছিদ্রকারী পোকা)														সময়কাল : ১৬০-১৮০ দিন											
আবহাওয়া সঠিকতা	মাস	এপ্রিল				মে				জুন				জুলাই				আগস্ট				সেপ্টেম্বর					
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা(°সেঃ)	সমস্ত পর্যায়ের জন্য সর্বোচ্চ প্রান্তিক তাপমাত্রা হল ৩৭°সেঃ, এবং ৪০°সেঃ প্রাণনাশক; ডিম, কীড়া, পুত্তলি- এর বিকাশের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা প্রায় ২৪-২৭°সেঃ																									
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	সর্বনিম্ন প্রান্তিক তাপমাত্রা হলো প্রায় ১০-১২°সেঃ																									
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	প্রায় ৮৫%																									
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	<৩৫%																									
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাতের সাথে নেতিবাচক অনুবন্ধ																									
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	১৮.০	২১.৭	২৫.০	৩৪.৭	৪০.৭	৫২.৭	৪৯.০	৬৯.৩	৬৬.৭	৮৫.৩	১.০৫.৩	১২৯.৭	১২৬.৩	৯৫.০	৭৭.৫	৭৯.৫	৮৪.৫	৮৪.০	৬৫.৫	৭৬.৫	৭৪.৫	৫০.০	৫৬.৫	৫৯.৫	৬১.৫	৬৮.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৩.৩	৩৩.৭	৩৩.৫	৩৩.৫	৩৩.৬	৩৩.৪	৩৩.৪	৩৩.২	৩৩.৩	৩২.৮	৩১.৯	৩১.৩	৩১.০	৩১.৯	৩২.০	৩১.৭	৩২.০	৩২.০	৩২.১	৩২.০	৩২.১	৩২.২	৩২.২	৩২.১	৩২.৪	৩২.২
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৩.৭	২৪.০	২৪.৬	২৪.৪	২৪.৪	২৫.১	২৫.২	২৫.৭	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.১	২৬.১	২৬.০	২৬.১	২৬.২	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৮
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৬.৬	৯৬.৪	৯৬.০	৯৬.০	৯৬.১	৯৬.২	৯৬.১	৯৬.২	৯৬.৫	৯৬.৪	৯৬.৬	৯৭.০	৯৭.৩	৯৫.৫	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৫.০	৯৫.০	৯৫.০	৯৫.০	৯৪.৮	৯৫.১	৯৫.২	৯৫.১	৯৫.৭
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৮.০	৫৯.০	৬১.৯	৬২.৫	৬৪.২	৬৫.৯	৬৭.৫	৬৯.৬	৭০.৯	৭৩.২	৭৬.৯	৭৯.২	৮০.৬	৭৬.৮	৭৬.৩	৭৭.০	৭৫.৭	৭৫.৩	৭৪.৭	৭৫.১	৭৪.৯	৭৩.৩	৭৪.০	৭২.৯	৭২.০	৭১.০
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৩.০	৫১.৩	৫৪.৭	৫১.৭	৪৯.০	৪৮.০	৪৬.০	৩৭.৩	৩৭.৩	৩০.৭	২৩.০	২১.৩	২০.৩	২৩.০	২৮.০	২৪.৫	৩২.০	১৭৭	১৭৯	১৮৩	১৮৭	১৮৫	১৯২	১৮৯	১৯৮	২১০	
ধাপ সমূহ																											
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		উদ্ভিদ্ধ বৃদ্ধি								ফুল এবং ফল				ফসল কাটা												
পোকাকার জীবন চক্র																											
			ডিম (২ থেকে ৪ দিন)				লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুত্তলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)		ডিম (২ থেকে ৪ দিন)		লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুত্তলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)								