















রবি মৌসুমের মরিচ ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফল ছিদ্রকারী পোকা): সিলেট অঞ্চল (জেলা: সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ), বাংলাদেশ

অঞ্চল : সিলেট		রবি মৌসুমের মরিচ (ফল ছিদ্রকারী পোকা)														সময়কাল : ১৫০-১৬০ দিন						
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	ডিসেম্বর				জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল				
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	সমস্ত পর্যায়ের জন্য সর্বোচ্চ প্রান্তিক তাপমাত্রা হল ৩৭°সেঃ, এবং ৪০°সেঃ প্রাণনাশক; ডিম, কীড়া, পুতুলি- এর বিকাশের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা প্রায় ২৪-২৭°সেঃ																				
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	সর্বনিম্ন প্রান্তিক তাপমাত্রা হলো প্রায় ১০-১২°সেঃ																				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	প্রায় ৮৫%																				
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	<৩৫%																				
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাতের সাথে নেতিবাচক অনুবন্ধ																				
সাপ্তাহিক ষাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসংগৃহ	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.৫	৪.৫	১.০	৪.০	০.০	০.৫	০.৫	১.০	২.৫	৪.০	৮.০	১১.৫	১১.০	১০.৫	১৭.৫	৩৪.০	৪৮.৫	৬৫.৫	৫৯.০	৭৮.৫	৮৫.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৭.৮	২৬.৯	২৬.১	২৫.৭	২৫.৩	২৪.৭	২৫.১	২৫.৮	২৬.৫	২৭.২	২৮.২	২৮.৯	৩০.০	৩১.০	৩১.৬	৩২.১	৩১.৮	৩২.১	৩২.৫	৩২.০	৩১.৭
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৪.৩	১৩.৭	১২.৬	১২.০	১১.৪	১১.৩	১১.৩	১১.১	১২.১	১২.৬	১৩.৭	১৪.৪	১৫.৪	১৬.৭	১৮.০	১৯.২	২০.০	২০.৮	২১.৪	২১.৮	২১.৮
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৪.৭	৯৫.৭	৯৫.৩	৯৬.১	৯৫.৮	৯৬.১	৯৫.৫	৯৪.৯	৯৪.৩	৯২.৯	৯২.৮	৯২.৫	৯১.৭	৯০.৯	৯০.৭	৯০.২	৯১.৭	৯২.৩	৯২.২	৯৩.১	৯৩.২
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫১.৪	৫৩.৬	৫৩.০	৫২.৭	৫৩.৫	৫৩.৯	৫০.৭	৪৮.১	৪৫.৮	৪২.৩	৪২.৫	৪১.৭	৪০.৮	৪১.১	৪১.০	৪৫.০	৫০.৯	৫৩.৫	৫৪.৭	৫৮.২	৫৯.৭
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘন্টা)	৫৫.৫	৫০.৫	৫১.৫	৫০.৫	৫১.০	৪৫.০	৪৮.০	৫১.০	৫০.৫	৫৫.০	৫৩.৫	৫৫.৫	৫৬.০	৫৫.০	৫৬.০	৫১.০	৪৭.০	৫০.৫	৫১.০	৪৮.৫	৪৬.৫
	ধাপ সমূহ																					
অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ					উজ্জ্বল বৃদ্ধি					ফুল এবং ফল					ফসল কাটা							
পোকাকার জীবন চক্র																						
					ডিম (২ থেকে ৪ দিন)		লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুতুলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)		ডিম (২ থেকে ৪ দিন)		লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুতুলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)			

অঞ্চল : সিলেট		খরিফ মৌসুমের মরিচঃ (ফল ছিদ্রকারী পোকা)													সময়কাল : ১৫০-১৬০ দিন								
মাস		এপ্রিল			মে			জুন			জুলাই			আগস্ট									
আবহাওয়া সড়কতা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	সমস্ত পর্যায়ের জন্য সর্বোচ্চ প্রান্তিক তাপমাত্রা হল ৩৭°সেঃ, এবং ৪০°সেঃ প্রাণনাশক; ডিম, কীড়া, পুতলি- এর বিকাশের জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা প্রায় ২৪-২৭°সেঃ																					
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	সর্বনিম্ন প্রান্তিক তাপমাত্রা হলো প্রায় ১০-১২°সেঃ																					
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	প্রায় ৮৫%																					
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	<৩৫%																					
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাতের সাথে নেতিবাচক অনুবন্ধ																					
সাপ্তাহিক ষাড়াবিক	প্রমানসগুহ	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৬৫.৫	৫৯.০	৭৮.৫	৮৫.৫	১০২.৫	১০৭.৫	১২২.০	১১৬.৫	১৪৮.৫	১৫২.০	১৬৮.০	১২৯.৫	১৩৭.৫	১৩০.০	১১০.০	১২৯.৫	১২৯.০	১২৩.৫	১০৩.০	১১৮.৫	১০৫.০	৯৬.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩২.১	৩২.৫	৩২.০	৩১.৭	৩১.৫	৩১.৬	৩১.৯	৩২.২	৩১.৫	৩১.৯	৩১.৬	৩১.৯	৩১.৯	৩১.৭	৩২.০	৩১.৮	৩২.২	৩২.৩	৩২.৮	৩২.২	৩২.২	৩২.৫
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২০.৮	২১.৪	২১.৮	২১.৮	২২.০	২২.৭	২৩.২	২৩.৬	২৪.০	২৪.৪	২৪.৯	২৫.০	২৫.০	২৫.০	২৫.২	২৫.০	২৫.০	২৫.১	২৫.৩	২৫.২	২৫.০	২৫.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯২.৩	৯২.২	৯৩.১	৯৩.২	৯৪.০	৯৪.৬	৯৪.৭	৯৪.৯	৯৫.২	৯৫.৮	৯৬.০	৯৬.২	৯৬.০	৯৫.৯	৯৬.০	৯৬.১	৯৬.২	৯৬.৪	৯৬.২	৯৬.৪	৯৬.৩	৯৬.৩
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৩.৫	৫৪.৭	৫৮.২	৫৯.৭	৬৩.১	৬৪.২	৬৫.৬	৬৭.২	৭০.৬	৭১.৮	৭৩.৬	৭৩.৭	৭৪.০	৭৩.৯	৭৩.৪	৭৪.২	৭২.৬	৭২.৪	৭০.৯	৭২.৮	৭৩.০	৭২.৪
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫০.৫	৫১.০	৪৮.৫	৪৬.৫	৪৫.০	৪৩.৫	৪৩.৫	৩৮.৫	৩৩.৫	৩১.৫	২৬.০	২৭.৫	২৩.৫	২৫.০	২৭.০	২৬.০	৩০	৩৩.০	৩৩.৫	২৯.৫	৩২.৫	৩৩.৫	
ধাপ সমূহ																							
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		উদ্ভিদ্ধ বৃদ্ধি					ফুল এবং ফল					ফসল কাটা										
পোকাকার জীবন চক্র																							
			ডিম (২ থেকে ৪ দিন)		লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুতলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)		ডিম (২ থেকে ৪ দিন)		লার্ভা (১৫ থেকে ১৮ দিন)		পুতলি (৭ থেকে ১০ দিন)		পূর্ণাঙ্গ (৭ থেকে ১০ দিন)						