























রবি মৌসুমের মরিচ ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (মাইটস)ঃযশোর অঞ্চল (জেলা: যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ

অঞ্চল : যশোর		রবি মৌসুমের মরিচঃ (মাইটস)										সময়কাল : ১৭০-১৮০ দিন															
আবহাওয়া সূচকতা	মাস	অক্টোবর			নভেম্বর			ডিসেম্বর				জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি			মার্চ									
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৩°সেঃ থেকে ৩৫°সেঃ; অনুকূল অবস্থায় ১ সপ্তাহের মধ্যে জীবন চক্র সম্পন্ন করতে পারে (২৫°সেঃ এবং উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা)																									
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১২ থেকে ১৪°সেঃ																									
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (৭৫% থেকে ৯০%)																									
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	<৩০%																									
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাতের অনুপস্থিতিতে যখন নিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং উচ্চতাপমাত্রা বিরাজমান থাকে তখন মাইটস পোকাকার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।																									
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৪৪.৫	৩৩.০	২৬.৫	২০.০	৯.০	৮.০	৭.৫	১.০	২.০	১.৫	৪.০	০.০	৩.৫	০.৫	১.৫	২.৫	৩.০	৬.৫	৫.০	৪.৫	৮.০	৪.০	২.৫	৪.৫	১১.৫	১২.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৩.২	৩৩.০	৩২.৭	৩১.৯	৩১.১	৩১.১	৩০.৩	২৯.৬	২৮.৫	২৭.৭	২৬.৬	২৫.৭	২৫.২	২৪.৫	২৪.৫	২৫.১	২৫.৬	২৬.৬	২৭.৮	২৮.৯	৩০.০	৩১.০	৩২.৪	৩৩.৬	৩৪.৭	৩৪.৬
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৫.১	২৪.৪	২৩.৪	২১.৬	২০.৭	১৯.৪	১৮.০	১৬.৭	১৫.১	১৪.০	১৩.৪	১২.৩	১১.৪	১০.৯	১০.৭	১১.০	১০.৮	১২.০	১৩.৩	১৪.৭	১৫.৬	১৬.৪	১৭.৭	১৯.০	২০.৮	২১.৮
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৯৬.৫	৯৬.৫	৯৬.৫	৯৬.১	৯৫.৯	৯৫.৯	৯৫.৭	৯৫.৭	৯৫.৪	৯৫.২	৯৫.৮	৯৫.৫	৯৫.৭	৯৫.৪	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৪.৯	৯৪.৯	৯৪.২	৯৪.০	৯৩.৭	৯৩.২	৯২.৫	৯২.১	৯২.১	৯২.৪
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৬৭.০	৬৪.৪	৬১.৫	৫৭.১	৫৬.২	৫২.০	৪৯.৮	৪৮.১	৪৬.৩	৪৭.২	৪৯.২	৪৯.৪	৪৭.৯	৪৯.৬	৪৭.৯	৪৭.০	৪৪.৭	৪৪.২	৪২.২	৪১.০	৩৯.৩	৩৬.৫	৩৫.৪	৩৪.৯	৩৬.৭	৪২.০
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪০.০	৪৩.৫	৪৭.০	৪৯.০	৪৫.৫	৪৮.৫	৪৯.৫	৪৭.৫	৪৮.৫	৪৭.৫	৪৩.৫	৪২.০	৪২.০	৪১.০	৪২.৫	৪৪.৫	৪৮.০	৪৮.৫	৪৯.৫	৫০.০	৫৪.৫	৫৫.০	৫৪.০	৫৫.০	৫৩.০	৫১.৫
ধাপ সমূহ																											
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ	উদ্ভিঞ্জ বৃদ্ধি					ফুল এবং ফল					ফসল কাটা															
পোকাকার জীবন চক্র																											
		ডিম (২ থেকে ৩ দিন)	কীড়া (২ থেকে ৩ দিন)	নিমফ (০১ দিন)	পূর্ণাঙ্গ (৮ থেকে ১৩ দিন)	ডিম (২ থেকে ৩ দিন)	কীড়া (২ থেকে ৩ দিন)	নিমফ (০১ দিন)	পূর্ণাঙ্গ (৮ থেকে ১৩ দিন)	ডিম (২ থেকে ৩ দিন)	কীড়া (২ থেকে ৩ দিন)	নিমফ (০১ দিন)	পূর্ণাঙ্গ (৮ থেকে ১৩ দিন)	ডিম (২ থেকে ৩ দিন)	কীড়া (২ থেকে ৩ দিন)	নিমফ (০১ দিন)	পূর্ণাঙ্গ (৮ থেকে ১৩ দিন)	ডিম (২ থেকে ৩ দিন)	কীড়া (২ থেকে ৩ দিন)	নিমফ (০১ দিন)	পূর্ণাঙ্গ (৮ থেকে ১৩ দিন)						

খরিফ মৌসুমের মরিচ ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (মাইটস)ঃযশোর অঞ্চল (জেলা: যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ

