











রবি মৌসুমে উৎপাদিত সয়াবিনের পোকাড় আবহাওয়ার পঞ্জিকা (বিছা পোকা): রংপুর অঞ্চল (জেলা: রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা), বাংলাদেশ

অঞ্চলঃ রংপুর		রবি মৌসুম সয়াবিন: বিছা পোকা										জীবনকালঃ ১১০-১২০ দিন						
মাস		জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি				মার্চ			এপ্রিল						
আবহাওয়া সার্কুলার	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	ডিম, কীড়া এবং পুতুলি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়, বধিত তাপমাত্রায় বিকাশের সময়কাল এবং পূর্ণাঙ্গ পোকের বেঁচে থাকার সময়কাল হ্রাস পায়। কীড়া বিকাশের জন্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯ ± ১°সে																
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	লার্ভা বিকাশের জন্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১২ ± ১°সেঃ																
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	উচ্চ আর্দ্রতা পোকের উপদ্রব বাড়ায়																
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)																	
	বৃষ্টিপাত (মিমি)																	
সাপ্তাহিক ষড়ভৌমিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	১.০	২.৫	২.০	১.০	১.০	১.৫	৩.৫	১.৫	২.৫	১.০	২.৫	৫.৫	১৮.৫	১১.০	১৯.৫	২৮.৫	৩১.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২২.৭	২২.৪	২৩.২	২৩.৪	২৪.৭	২৫.৯	২৬.৭	২৭.৫	২৮.৫	২৯.৯	৩০.৮	৩১.৬	৩১.৪	৩২.১	৩২.৫	৩২.৩	৩২.০
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১০.৯	১০.৪	১০.৮	১০.৮	১১.৮	১২.৭	১৩.৭	১৪.৪	১৫.৩	১৬.১	১৭.৩	১৮.৪	১৯.৫	২০.৩	২১.১	২১.৯	২১.৯
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৯৬.০	৯৬.০	৯৫.৮	৯৫.৭	৯৫.৫	৯৪.৩	৯৩.৭	৯২.৯	৯১.৪	৮৯.৮	৮৮.৭	৮৮.১	৮৭.৭	৮৮.৫	৮৮.৪	৮৯.৯	৯০.৯
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা (%)	৫৮.৫	৫৭.৮	৫৬.২	৫৪.২	৫১.৬	৪৮.০	৪৭.১	৪৫.৩	৪২.৮	৩৯.৬	৪০.৮	৪২.৫	৪৮.৮	৪৯.৭	৫০.৭	৫৬.৭	৫৯.০
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৩৬.০	৩৬.৫	৩৯.৫	৪১.০	৪৪.০	৪৮.৫	৫০.০	৫১.৫	৫৬.৫	৫৭.৫	৫৭.০	৫৪.০	৪৯.০	৫১.৫	৫১.০	৪৭.৫	৪৭.০
ধাপ সমূহ																		
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা	অঙ্গজ বৃদ্ধি পর্যায়						জাননিক বৃদ্ধি পর্যায়						পরিপক্ক এবং ফসল সংগ্রহ পর্যায়				
জীবন চক্র																		
		ডিম		কীড়া				পুতুলি				পূর্ণাঙ্গ		ডিম		কীড়া		