












রবি মৌসুমে উৎপাদিত সয়াবিন ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফল ছিদ্রকারী পোকা): বরিশাল অঞ্চল (জেলা: বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, বরগুনা ও ভোলা), বাংলাদেশ

অঞ্চল: বরিশাল		রবি মৌসুম সয়াবিন: ফল ছিদ্রকারী পোকা							জীবনকাল: ১১০-১২০ দিন									
আবহাওয়া সর্বকত	মাস	জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি				মার্চ			এপ্রিল						
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৭.৪৮-৩১.৪৪ °সেঃ																
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৯.৭৩-২৩.৯১ °সেঃ																
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	গড় আপেক্ষিক আদ্রতা ৮৬.১৮-৯৩.৬১%																
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)																	
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	সাপ্তাহিক মোট গড় বৃষ্টিপাত ১১.০৭ মিমি থেকে ৯৮.৩৩ মিমি এবং এর সাথে পূর্ববর্তী সপ্তাহগুলিতে নিম্ন মাঝারী বৃষ্টিপাত ও বর্তমান সপ্তাহগুলিতে উচ্চ বৃষ্টিপাত বিরাজ করবে।																
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	১.৩	১.০	১.০	১.৭	২.৭	৩.৭	৫.০	৮.০	৫.৭	৫.৩	৬.০	১৪.৩	১৮.০	১৮.০	২১.৭	২৫.০	৩৪.৭
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৫.১	২৫.২	২৫.৮	২৬.২	২৭.০	২৭.৮	২৮.৯	২৯.৭	৩০.৭	৩১.৭	৩২.৭	৩৩.০	৩৩.৯	৩৩.৩	৩৩.৭	৩৩.৫	৩৩.৫
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১২.৬	১২.৫	১২.৭	১২.৫	১৪.০	১৪.৬	১৬.২	১৬.৯	১৮.৩	১৯.৫	২০.৫	২২.১	২২.৮	২৩.৭	২৪.০	২৪.৬	২৪.৪
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৮.০	৯৭.৮	৯৭.৬	৯৭.৬	৯৭.৩	৯৭.১	৯৭.০	৯৭.০	৯৬.৭	৯৭.১	৯৬.৭	৯৬.৫	৯৬.৫	৯৬.৬	৯৬.৪	৯৬.০	৯৬.০
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫০.১	৪৯.৩	৪৮.৫	৪৫.২	৪৬.২	৪৪.৮	৪৬.২	৪৫.১	৪৪.৯	৪৫.২	৪৫.৩	৫০.৭	৫৪.৪	৫৮.০	৫৯.৮	৬১.৯	৬২.৫
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪৬.৭	৪৪.০	৪৭.৩	৫২.৭	৫০.৩	৫২.৩	৫১.৭	৫২.০	৫৩.৭	৫৪.০	৫৪.৩	৫২.৩	৫০.৭	৫৩.০	৫১.৩	৫৪.৭	৫১.৭
ধাপ সমূহ																		
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা		অঙ্কুর বৃদ্ধি পর্যায়							জাননিক পর্যায়			পরিপক্ক এবং ফসল সংগ্রহ পর্যায়					
জীবন চক্র																		
		ডিম	কীড়া	পুতুলি	পূর্ণাঙ্গ	ডিম	কীড়া	পুতুলি										