





















রবি মৌসুমের শসা ফসলের পোকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফলের মাছি পোকা) ঢাকা অঞ্চল (জেলা: ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ), বাংলাদেশ

অঞ্চল : ঢাকা		রবি মৌসুমের শসা : (ফলের মাছি পোকা)											সময়কাল : ১২০-১৫০ দিন										
মাস		এপ্রিল			মে			জুন					জুলাই				আগস্ট						
আবহাওয়া সূচক	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩০°সেঃ																					
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২২°সেঃ																					
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৮৫																					
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৬০																					
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	মেঘলা এবং বৃষ্টির অবস্থা																					
	প্রধানসমূহ	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
বৃষ্টিপাত (মিমি)	১২.৫	১০.০	৬.০	১.৫	৪.৫	১.৫	৪.৫	১.০	৩.৫	১.০	০.০	০.০	০.৫	৩.৫	৩.৫	২.৫	১২.০	৩.৫	৪.০	৯.৫	১৩.৫		
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩০.৯	৩০.৬	২৯.৮	২৯.০	২৮.৩	২৭.৬	২৬.৯	২৬.২	২৫.৫	২৪.৮	২৪.০	২৩.৯	২৪.৫	২৫.০	২৬.২	২৭.২	২৮.৩	২৮.৯	৩০.০	৩১.৫	৩২.৩	৩৩.৪	
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২১.৫	২০.৫	১৮.৭	১৭.৭	১৬.১	১৫.৫	১৪.৭	১৩.৫	১২.৯	১২.৪	১২.০	১২.০	১২.১	১৩.৬	১৪.৩	১৫.৫	১৬.৫	১৭.৫	১৮.৬	১৯.৮	১৯.৮	১৯.৮	
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৪.৫	৯৫.০	৯৪.৭	৯৪.৬	৯৪.৩	৯৪.৮	৯৫.৩	৯৫.০	৯৪.৬	৯৪.৩	৯৪.৩	৯৩.৮	৯৩.৪	৯২.৪	৯২.১	৯১.৭	৯১.১	৯০.০	৮৯.৯	৮৯.২	৮৯.৬	৮৯.৬	
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৪.৬	৫১.৫	৪৯.৩	৪৭.৫	৪৬.৩	৪৭.৬	৪৯.৪	৪৯.৮	৪৯.১	৫০.৩	৪৮.৮	৪৬.২	৪৩.৩	৪২.৩	৩৯.৪	৩৯.৭	৩৮.৯	৩৬.০	৩৫.৫	৩৫.৯	৩৮.৯	৩৮.৯	
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪৯.৫	৫১.৫	৫১.৫	৫২.০	৫১.৫	৪৮.৫	৪৬.৫	৪৪.৫	৪৪.৫	৪২.৫	৪২.৫	৪৫.০	৪৯.০	৪৯.৫	৫১.৫	৫৩.০	৫৪.৫	৫৬.০	৫৫.০	৫৮.০	৫৫.৫	৫৫.৫	
ধাপ সমূহ																							
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ				অঙ্গজ বৃদ্ধি			ফুল ও ফল					ফসল কাটা										
পোকার জীবন চক্র																							
	ডিম		কীড়া			পুতুলি		প্রাপ্তবয়স্ক		ডিম		কীড়া		পুতুলি		প্রাপ্তবয়স্ক		ডিম		কীড়া		পুতুলি	

খরিফ মৌসুমের শসা ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (ফলের মাছি পোকা): ঢাকা অঞ্চল (জেলা: ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ), বাংলাদেশ

অঞ্চল ও ঢাকা		খরিফ মৌসুমের শসা : (ফলের মাছি পোকা)																			সময়কাল : ১২০-১৫০ দিন					
মাস		মার্চ					এপ্রিল					মে					জুন					জুলাই				
ঢাকা অঞ্চল আবহাওয়া সড়কতা	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩০°সেঃ																								
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২২°সেঃ																								
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৮৫																								
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৬০																								
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	মেঘলা এবং বৃষ্টির অবস্থা																								
সাপ্তাহিক ষাড়াবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০			
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৩.৫	৪.০	৯.৫	১৩.৫	২০.৫	২৫.০	২১.০	৩১.৫	৪২.৫	৪৬.০	৫৫.৫	৫৫.০	৭৫.৫	৭০.০	৭২.৫	৮৬.৫	৮১.০	৭৭.৫	৮২.৫	৭৩.৫	৯১.০	৮১.৫			
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩০.০	৩১.৫	৩২.৩	৩৩.৪	৩৩.২	৩৩.৯	৩৪.৬	৩৪.১	৩৩.৮	৩৩.৬	৩৩.৭	৩৩.৭	৩৩.২	৩৩.৫	৩৩.৪	৩২.৮	৩২.২	৩২.২	৩২.১	৩২.০	৩১.৭	৩২.২			
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৭.৫	১৮.৬	১৯.৮	১৯.৮	২১.৮	২২.৯	২৩.৫	২৩.৭	২৩.৬	২৩.৭	২৪.২	২৪.৬	২৪.৯	২৫.৪	২৫.৮	২৫.৯	২৬.২	২৬.২	২৬.১	২৬.২	২৬.০	২৬.০			
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯০.০	৮৯.৯	৮৯.২	৮৯.৬	৯০.৩	৯১.৩	৯১.৪	৯১.৪	৯১.৭	৯২.৩	৯২.৮	৯২.৯	৯৩.৫	৯৩.৮	৯৪.০	৯৪.৫	৯৪.৪	৯৪.৭	৯৪.৭	৯৪.১	৯৪.৫	৯৪.৩			
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৩৬.০	৩৫.৫	৩৫.৯	৩৬.৯	৪৪.৫	৪৫.৯	৪৭.১	৫২.০	৫৫.১	৫৬.৭	৫৮.৬	৬০.৪	৬৩.৫	৬৫.০	৬৬.৭	৬৯.৯	৭১.৫	৭২.৯	৭৩.৫	৭৩.১	৭৩.৫	৭১.১			
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৬.০	৫৫.০	৫৮.০	৫৫.৫	৫২.৫	৫৩.৫	৫৪.০	৫৫.০	৫৪.৫	৫১.৫	৪৮.০	৪৮.০	৪২.৫	৪২.০	৩৮.৫	৩১.০	২৬.০	২৬.০	২৭.০	২৭.৫	২৮.৫	৩২.০			
	ধাপ সমূহ																									
অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		অঙ্গজ বৃদ্ধি		ফুল ও ফল										ফসল কাটা												
পোকাকার জীবন চক্র																										
		ডিম	কীড়া	পুতুলি	প্রাপ্তবয়স্ক	ডিম	কীড়া	পুতুলি	প্রাপ্তবয়স্ক	ডিম	কীড়া	পুতুলি	প্রাপ্তবয়স্ক	ডিম	কীড়া	পুতুলি	প্রাপ্তবয়স্ক									