
























রবি মৌসুমের শসা ফসলের পোকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (লাল কুমড়া বিটল পোকা): বগুড়া অঞ্চল (জেলা: পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট), বাংলাদেশ

অঞ্চল : বগুড়া		রবি মৌসুমের শসা : (লাল কুমড়া বিটল পোকা)										সময়কাল : ১০০-১২০ দিন						
আবহাওয়া সর্ভকর্তা	মাস	ফেব্রুয়ারি			মার্চ				এপ্রিল			মে						
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৫°সেঃ (৩০°সেঃ সর্বোত্তম তাপমাত্রা ডিম অবস্থান এবং খাদ্য গ্রহণ উভয়ের জন্য)																
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৫°সেঃ বা তার নিচে																
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার অগ্রগতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আপেক্ষিক আর্দ্রতার ওঠানামার বিস্তৃত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম																
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	আপেক্ষিক আর্দ্রতার ওঠানামার বিস্তৃত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম																
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	লাল কুমড়া পোকা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক																
সাপ্তাহিক স্থানিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	১.০	৪.০	৩.০	৫.০	২.০	৪.০	৩.০	৮.০	৮.০	১২.০	২৬.০	২৮.০	৩৭.০	৪২.০	৪৫.০	৫৮.০	৫৯.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৬.৯	২৭.৭	২৮.৬	২৯.৩	৩০.৯	৩১.৯	৩২.৯	৩২.৯	৩৩.৯	৩৪.৩	৩৪.০	৩৩.৬	৩৩.১	৩৩.৬	৩৩.৪	৩৩.৩	৩৩.৯
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৩.৬	১৪.৬	১৫.৪	১৬.৪	১৭.৪	১৮.৩	২০.০	২১.১	২২.৩	২৩.০	২৩.০	২৩.১	২৩.৩	২৩.৯	২৪.৩	২৪.৬	২৫.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯২.১	৯১.৪	৯০.৪	৮৮.৭	৮৯.১	৮৬.৪	৮৬.৩	৮৭.৭	৮৮.০	৮৮.৩	৯০.৬	৯০.৯	৯২.৪	৯২.৪	৯২.৭	৯৩.০	৯৩.৭
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪১.৪	৪০.৩	৩৯.১	৩৮.০	৩৬.৯	৩৭.১	৩৯.১	৪৫.৩	৪৪.৪	৪৫.৯	৫০.৭	৫৪.৯	৫৭.৩	৫৮.৭	৬০.০	৬৩.৪	৬৪.৬
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫২.০	৫৩.০	৫৬.০	৬০.০	৫৯.০	৬১.০	৫৮.০	৫৬.০	৫৬.০	৫৬.০	৫৫.০	৫২.০	৪৮.০	৫০.০	৪৯.০	৪৬.০	৪৪.০
ধাপ সমূহ																		
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		অঙ্গজ বৃদ্ধি		ফুল ও ফল				ফসল কাটা									
পোকার জীবন চক্র																		
			ডিম (৬ থেকে ১৫ দিন)	কীড়া (১৩ থেকে ২৫ দিন)	পুতুলি (৭ থেকে ২০ দিন)	প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)	প্রাপ্তবয়স্ক (ক্ষতিগ্রস্ত ফুল এবং অপরিপক্ক ফল)	ডিম (৬ থেকে ১৫ দিন)	কীড়া (১৩ থেকে ২৫ দিন)	পুতুলি (৭ থেকে ২০ দিন)								

খরিফ মৌসুমের শসা ফসলের পোকাকার আবহাওয়া পঞ্জিকা (লাল কুমড়া বিটল পোকা): বগুড়া অঞ্চল (জেলা: পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট), বাংলাদেশ

অঞ্চল : বগুড়া		খরিফ মৌসুমের শসা : (লাল কুমড়া বিটল পোকা)											সময়কাল : ১০০-১২০ দিন						
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	জুলাই			আগস্ট				সেপ্টেম্বর				অক্টোবর						
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৫°সেঃ (৩০°সেঃ সর্বোত্তম তাপমাত্রা ডিম্ব অবস্থান এবং খাদ্য গ্রহণ উভয়ের জন্য)																	
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৫°সেঃ বা তার নিচে																	
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার অগ্রগতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আপেক্ষিক আর্দ্রতার ওঠানামার বিস্তৃত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম																	
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	আপেক্ষিক আর্দ্রতার ওঠানামার বিস্তৃত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম																	
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	লাল কুমড়া পোকা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্ক																	
সাপ্তাহিক ষাভাবিক	প্রধানসপ্তাহ	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৯৩.০	৮০.০	৯১.০	৭৬.০	৬৩.০	৬১.০	৭২.০	৬৭.০	৫৬.০	৬০.০	৬০.০	৭৬.০	৭৪.০	৫১.০	৪২.০	২৫.০	১৮.০	
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩২.০	৩১.৯	৩২.০	৩২.১	৩২.৩	৩২.৬	৩২.১	৩২.৩	৩২.৬	৩২.৩	৩২.০	৩২.১	৩২.০	৩২.১	৩২.৩	৩২.০	৩১.৬	
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৬.০	২৬.১	২৬.০	২৬.১	২৬.৩	২৬.৯	২৬.৩	২৬.৪	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.১	২৫.০	২৪.০	২৩.৪	২১.৭
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৫.৯	৯৫.৯	৯৫.৯	৯৫.৯	৯৫.১	৯৫.৩	৯৫.৬	৯৫.৯	৯৫.৭	৯৫.৯	৯৬.৩	৯৬.১	৯৬.৪	৯৬.০	৯৬.০	৯৫.৭	৯৫.১	
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭৩.৩	৭৪.১	৭৪.৪	৭৩.৩	৭২.০	৭১.৯	৭৩.৩	৭২.৭	৭১.৭	৭২.০	৭২.৩	৭০.৭	৭১.০	৬৮.৭	৬৬.০	৬২.১	৫৭.৯	
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	২৮.০	৩১.০	২৯.০	২৮.০	৩৫.০	৩৭.০	৩৬.০	৩১.০	৩৫.০	৩৫.০	৩৫.০	৩৭.০	৩৭.০	৪৪.০	৪৮.০	৫৪.০	৫৭.০	
ধাপ সমূহ																			
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ	অঙ্গজ বৃদ্ধি	ফুল ও ফল				ফসল কাটা												
পোকাকার জীবন চক্র																			
			ডিম (৬ থেকে ১৫ দিন)	কীড়া (১৩ থেকে ২৫ দিন)	পুতুলি (৭ থেকে ২০ দিন)	প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)	প্রাপ্তবয়স্ক (ক্ষতিগ্রস্ত ফুল এবং অপরিপক্ক ফল)	ডিম (৬ থেকে ১৫ দিন)	কীড়া (১৩ থেকে ২৫ দিন)	পুতুলি (৭ থেকে ২০ দিন)									