










রবি মৌসুমের রোগের আবহাওয়ার পঞ্জিকা পটল (রুট নট রোগ): দিনাজপুর অঞ্চল (জেলা: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগাওর) বাংলাদেশ

অঞ্চল : দিনাজপুর		রবি মৌসুম পটল : (রুট নট রোগ)														সময়কাল : ১৪০-১৫০ দিন						
আবহাওয়া সর্ভকতা	মাস	মে				জুন				জুলাই						আগস্ট		সেপ্টেম্বর				
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	মাটির তাপমাত্রা: ২৮°সেঃ, গরম গ্রীষ্ম দীর্ঘ এবং শীতকাল ছোট এবং হালকা																				
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	মাটির তাপমাত্রা: ১৬°সেঃ																				
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯০%																				
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭০%																				
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	-----																				
সাপ্তাহিক ষাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৩১.০	৩৬.০	৫৭.০	৫৫.০	৭৩.০	৫৭.০	৭৭.০	১১১.০	৯৬.০	১০৯.০	১০৫.০	৮১.০	৮৪.০	৭০.০	৬০.০	৯৩.০	১০৩.০	৭১.০	৬৬.০	৬১.০	৭৩.০
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩২.৩	৩২.৯	৩৩.০	৩৩.০	৩৩.৪	৩৩.৩	৩৩.০	৩২.৩	৩২.৪	৩২.০	৩২.১	৩২.১	৩২.৩	৩২.৯	৩২.৬	৩২.৪	৩২.১	৩২.৪	৩২.৩	৩২.৪	৩২.০
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২২.৩	২২.৯	২৩.৬	২৪.০	২৪.৪	২৫.০	২৫.১	২৫.৬	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৬.৩	২৬.৭	২৬.১	২৬.০	২৬.০	২৬.০	২৫.৭	২৫.১
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯২.৩	৯২.০	৯২.১	৯২.৪	৯২.৭	৯৩.৪	৯৩.৯	৯৪.৭	৯৪.৪	৯৫.১	৯৪.৬	৯৪.৪	৯৪.৭	৯৪.১	৯৪.০	৯৫.০	৯৫.৭	৯৫.৬	৯৫.৬	৯৬.১	৯৬.০
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৭.৬	৫৭.৩	৫৯.৩	৬২.৪	৬২.৩	৬৫.৪	৬৭.৭	৭১.৪	৭১.৬	৭৩.৩	৭২.৭	৭১.৯	৭১.৬	৭০.১	৭০.৯	৭২.৬	৭৩.১	৭১.৬	৭২.৪	৭১.৩	৭১.৬
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪৯.০	৫১.০	৪৮.০	৪৪.০	৪২.০	৪০.০	৩৫.০	২৭.০	৩১.০	২৭.০	২৯.০	৩১.০	৩৬.০	৩৬.০	৩৭.০	৩৪.০	৩৪.০	৩৭.০	৩৭.০	৩৬.০	৩৩.০
ধাপ সমূহ																						
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ				উদ্ভিজ্জ বৃদ্ধি				ফুল ও ফল						ফসল কাটা							
রোগের জীবন চক্র																						
	ডিম পাড়ে মূল পৃষ্ঠে (৪ দিন)		কিশোর বিকাশ (১২ দিন)		কিশোর সংক্রমণ এবং অনুপ্রবেশ (২ দিন)		পিত্ত গঠন (১০ দিন)		রোগ সংঘটিত হওয়ার পর রোগ চক্র ফল ধরার পর্যায় পর্যন্ত চলতে থাকে													