














রবি মৌসুমের পোকাকার আবহাওয়ার পঞ্জিকা বেগুন (পাতা ফড়িং পোকা)ঃ যশোর অঞ্চল (জেলা: যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ

অঞ্চল : যশোর		রবি মৌসুম বেগুন : (পাতা ফড়িং পোকা)															সময়কাল : ১৭০-১৮০ দিন											
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	সেপ্টেম্বর					অক্টোবর					নভেম্বর					ডিসেম্বর					জানুয়ারি			ফেব্রুয়ারি			মার্চ
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩১°সেঃ; ডিম পাড়ার জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা হল ২৪°সেঃ এবং ৩২°সেঃ এর উপরে বা ১৬.৫°সেঃ এর নিচে ডিম পাড়া না।																										
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২১°সেঃ; ডিম পাড়ার জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা হল ২৪°সেঃ এবং ৩২°সেঃ এর উপরে বা ১৬.৫°সেঃ এর নিচে ডিম পাড়া না।																										
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	সকালের আপেক্ষিক আদ্রতা ৮২ থেকে ৯০ শতাংশ জনসংখ্যার গতিশীলতাকে সমর্থন করে																										
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	সন্ধ্যায় আপেক্ষিক আদ্রতা ৫৫ থেকে ৬৬ শতাংশ জনসংখ্যার গতিশীলতার পক্ষে																										
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাত লিফফারের কার্যকলাপের জন্য অনুকূল																										
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৬৮.০	৫৯.০	৬৯.৫	৪৪.৫	৩৩.০	২৬.৫	২০.০	৯.০	৮.০	৭.৫	১.০	২.০	১.৫	৪.০	০.০	৩.৫	০.৫	১.৫	২.৫	৩.০	৬.৫	৫.০	৪.৫	৮.০	৪.০	২.৫	
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩২.৯	৩৩.০	৩৩.২	৩৩.২	৩৩.০	৩২.৭	৩১.৯	৩১.১	৩১.১	৩০.৩	২৯.৬	২৮.৫	২৭.৭	২৬.৬	২৫.৭	২৫.২	২৪.৫	২৪.৫	২৫.১	২৫.৬	২৬.৬	২৭.৮	২৮.৯	৩০.০	৩১.০	৩২.৪	
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৬.০	২৬.০	২৫.৩	২৫.১	২৪.৪	২৩.৪	২১.৬	২০.৭	১৯.৪	১৮.০	১৬.৭	১৫.১	১৪.০	১৩.৪	১২.৩	১১.৪	১০.৯	১০.৭	১১.০	১০.৮	১২.০	১৩.৩	১৪.৭	১৫.৬	১৬.৪	১৭.৭	
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৬.৬	৯৬.৩	৯৬.৬	৯৬.৫	৯৬.৫	৯৬.৫	৯৬.১	৯৫.৯	৯৫.৯	৯৫.৭	৯৫.৭	৯৫.৪	৯৫.২	৯৫.৮	৯৫.৫	৯৫.৭	৯৫.৪	৯৫.৩	৯৫.৩	৯৪.৯	৯৪.৯	৯৪.২	৯৪.০	৯৩.৭	৯৩.২	৯২.৫	
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭০.৮	৬৯.৭	৬৭.৭	৬৭.০	৬৪.৪	৬১.৫	৫৭.১	৫৬.২	৫২.০	৪৯.৮	৪৮.১	৪৬.৩	৪৭.২	৪৯.২	৪৯.৪	৪৭.৯	৪৯.৬	৪৭.৯	৪৭.০	৪৪.৭	৪৪.২	৪২.২	৪১.০	৩৯.৩	৩৬.৫	৩৫.৪	
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৩৩.০	৩২.৫	৩৮.৫	৪০.০	৪৩.৫	৪৭.০	৪৯.০	৪৫.৫	৪৮.৫	৪৯.৫	৪৭.৫	৪৮.৫	৪৭.৫	৪৩.৫	৪২.০	৪২.০	৪১.০	৪২.৫	৪৪.৫	৪৮.০	৪৮.৫	৪৯.৫	৫০.০	৫৪.৫	৫৫.০	৫৪.০	
ধাপ সমূহ																												
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ					উদ্ভিদ্ধ বৃদ্ধি										ফুল					ফল			ফসল কাটা				
পোকাকার জীবন চক্র																												
	ডিম পাড়া ও বের হওয়া (৭ থেকে ১০ দিন)		নিম্ফ (১৪ থেকে ৩০ দিন)			প্রাপ্তবয়স্ক (১৬ থেকে ১৮ দিন)					ডিম পাড়া ও বের হওয়া (৭ থেকে ১০ দিন)					নিম্ফ (১৪ থেকে ৩০ দিন)			প্রাপ্তবয়স্ক (১৬ থেকে ১৮ দিন)									

খরিফ মৌসুমের পোকাকার আবহাওয়ার পঞ্জিকা বেগুন (পাতা ফড়িং পোকা)ঃ যশোর অঞ্চল (জেলা: যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, বিনাইদহ, মেহেরপুর, মাগুরা), বাংলাদেশ

অঞ্চল : যশোর		খরিফ মৌসুম বেগুন : (পাতা ফড়িং পোকা)														সময়কাল : ১৭০-১৮০ দিন										
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	মার্চ				এপ্রিল				মে				জুন				জুলাই				আগস্ট				
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩১°সেঃ; ডিম পাড়ার জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা হল ২৪°সেঃ এবং ৩২°সেঃ এর উপরে বা ১৬.৫°সেঃ এর নিচে ডিম পাড়া না।																								
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২১°সেঃ; ডিম পাড়ার জন্য সর্বোত্তম তাপমাত্রা হল ২৪°সেঃ এবং ৩২°সেঃ এর উপরে বা ১৬.৫°সেঃ এর নিচে ডিম পাড়া না।																								
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	সকালের আপেক্ষিক আদ্রতা ৮২ থেকে ৯০ শতাংশ জনসংখ্যার গতিশীলতাকে সমর্থন করে																								
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	সন্ধ্যায় আপেক্ষিক আদ্রতা ৫৫ থেকে ৬৬ শতাংশ জনসংখ্যার গতিশীলতার পক্ষে																								
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	বৃষ্টিপাত লিফফপারের কার্যকলাপের জন্য অনুকূল																								
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৪.৫	১১.৫	১২.০	১১.৫	৭.০	১২.৫	২১.৫	২৮.৫	৩০.৫	৩৬.০	৪৪.৫	৩৮.৫	৪৯.৫	৫৪.৫	৮১.০	৭২.৫	৮২.০	৭২.০	৮৩.৫	৭৩.০	৬৩.৫	৫৬.০	৬৮.০	৪৮.৫	৫০.৫
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৩.৬	৩৪.৭	৩৪.৬	৩৫.৫	৩৬.১	৩৬.৫	৩৬.৩	৩৬.০	৩৬.০	৩৫.৯	৩৫.৫	৩৫.৬	৩৫.৩	৩৪.০	৩৩.৩	৩৩.০	৩২.৭	৩২.৯	৩২.৭	৩২.৭	৩৩.০	৩২.৮	৩২.৭	৩৩.১	৩৩.৩
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৯.০	২০.৮	২১.৮	২২.৮	২৩.৫	২৪.১	২৪.২	২৪.২	২৫.২	২৫.০	২৫.৫	২৬.০	২৬.২	২৬.২	২৬.১	২৬.২	২৬.০	২৬.১	২৬.২	২৬.২	২৬.০	২৬.২	২৬.০	২৬.১	২৬.০
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯২.১	৯২.১	৯২.৪	৯২.৪	৯২.৯	৯২.৪	৯২.৩	৯২.৮	৯২.৭	৯৩.১	৯৩.৬	৯৪.০	৯৪.১	৯৪.৮	৯৫.৭	৯৬.০	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.১	৯৬.০	৯৬.২	৯৬.৫	৯৬.২	৯৬.২
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৩৪.৯	৩৬.৭	৪২.০	৪১.৫	৪১.৬	৪৪.৩	৪৬.৯	৪৯.৯	৫১.৭	৫৪.৮	৫৮.৭	৬০.০	৬২.১	৬৭.৫	৭১.৭	৭৩.৫	৭৪.৪	৭৩.৪	৭৪.৬	৭৩.৪	৭২.৬	৭৩.০	৭৩.০	৭১.৭	৭১.০
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৫৫.০	৫৩.০	৫১.৫	৫৫.৫	৫৪.৫	৫৪.৫	৫৫.৫	৫৪.০	৫১.৫	৫২.৫	৪৬.৫	৪৫.৫	৪১.৫	৩২.০	২৬.৫	২৬.০	২৪.৫	২৯.০	২৫.০	২৯.৫	৩২.৫	৩০.০	২৮.০	৩০.৫	৩২.৫
ধাপ সমূহ																										
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ		উদ্ভিদ্ধ বৃদ্ধি						ফুল				ফল				ফসল কাটা									
পোকাকার জীবন চক্র																										
	ডিম পাড়া ও বের হওয়া (৭ থেকে ১০ দিন)		নিম্ফ (১৪ থেকে ৩০ দিন)	প্রাপ্তবয়স্ক (১৬ থেকে ১৮ দিন)	ডিম পাড়া ও বের হওয়া (৭ থেকে ১০ দিন)	নিম্ফ (১৪ থেকে ৩০ দিন)	প্রাপ্তবয়স্ক (১৬ থেকে ১৮ দিন)																			