










রবি মৌসুমের পোকাকার আবহাওয়ার পঞ্জিকা মিষ্টি কুমড়া (লাল কুমড়া পোকা) কুমিল্লা অঞ্চল (জেলা: কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া), বাংলাদেশ

অঞ্চল : কুমিল্লা		রবি মৌসুম মিষ্টি কুমড়া : (লাল কুমড়া পোকা)																সময়কাল : ১০০-১২০ দিন																
আবহাওয়া সতর্কতা	মাস	অক্টোবর				নভেম্বর				ডিসেম্বর				জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি																
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৫°সেঃ (৩০°সেঃ সর্বোত্তম তাপমাত্রা ডিম্ব অবস্থান এবং খাদ্য গ্রহণ উভয়ের জন্য)																																
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৫°সেঃ বা তার নিচে																																
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আদ্রতার অগ্রগতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আপেক্ষিক																																
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	আপেক্ষিক আদ্রতার ওঠানামার বিপ্লুত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম																																
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	লাল কুমড়া পোকা প্রাচুর্যের সাথে নেতিবাচক সম্পর্ক																																
প্রধানসপ্তাহ	৪২	৪৩	৪৪				৪৫				৪৬				৪৭				৪৮															
বৃষ্টিপাত (মিমি)	৩০.৫	১৬.০	১১.৫				১৮.০				৮.৫				৪.০				২.৫															
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩১.৮	৩১.২	৩১.০				৩০.৫				২৯.৮				২৯.০				২৮.২															
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	২৪.৩	২২.৮	২১.৮				২১.০				১৯.৩				১৮.১				১৬.৯															
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৫.৫	৯৫.২	৯৫.৩				৯৫.৬				৯৫.৩				৯৫.৮				৯৫.৮															
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৬৫.৮	৬১.৯	৬০.৬				৫৮.২				৫৪.৮				৫২.৬				৫২.২															
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪৪.৫	৫০.৫	৪৭.০				৪৯.৫				৫০.০				৫০.৫				৪৮.৫															
ধাপ সমূহ																																		
	অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ				অঙ্গজ বৃদ্ধি				ফুল ও ফল				ফসল কাটা																					
পোকাকার জীবন চক্র																																		
	ডিম (৬ থেকে ১৫ দিন)				লার্ভা (১৩ থেকে ২৫ দিন)				পিউপা (৭ থেকে ২০ দিন)				প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)				প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)																	

খরিফ মৌসুমের পোকাকার আবহাওয়ার পঞ্জিকা মিষ্টি কুমড়া (লাল কুমড়া পোকা): কুমিল্লা অঞ্চল (জেলা: কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া), বাংলাদেশ

অঞ্চল : কুমিল্লা		খরিফ মৌসুম মিষ্টি কুমড়া : (লাল কুমড়া পোকা)										সময়কাল : ১০০-১২০ দিন							
আবহাওয়া সর্ভকত	মাস	ফেব্রুয়ারি										মার্চ		এপ্রিল			মে		
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	৩৫°সেঃ (৩০°সেঃ সর্বোত্তম তাপমাত্রা ডিম্ব অবস্থান এবং খাদ্য গ্রহণ উভয়ের জন্য)																	
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৫°সেঃ বা তার নিচে																	
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	তাপমাত্রা এবং আপেক্ষিক আদ্রতার অগ্রগতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে আপেক্ষিক																	
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	আপেক্ষিক আদ্রতার ওঠানামার বিপ্লুত পরিসর সহ্য করতে সক্ষম																	
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	লাল কুমড়া পোকা প্রাচুর্যের সাথে নেতিবাচক সম্পর্ক																	
সাপ্তাহিক স্বাভাবিক আবহাওয়া	প্রধানসপ্তাহ	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
	বৃষ্টিপাত (মিমি)	৩.০	৩.০	৬.০	৭.৫	৪.৫	৭.০	৯.০	১৯.০	২৭.০	২৫.৫	২৩.০	৩৩.০	৪২.০	৫৪.৫	৬৩.৫	৬৬.০	৭১.০	
	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৬.২	২৭.৩	২৮.১	২৯.১	২৯.৮	৩০.৯	৩২.০	৩২.২	৩২.৫	৩২.৫	৩৩.০	৩৩.২	৩৩.১	৩২.৯	৩৩.২	৩৩.২	৩২.৯	
	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সেঃ)	১৪.২	১৪.৫	১৬.২	১৬.৭	১৮.১	১৯.২	১৯.৯	২১.৫	২২.০	২৩.১	২৩.৫	২৩.৭	২৩.৫	২৩.৭	২৪.৩	২৪.৭	২৫.২	
	সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯৪.৬	৯৪.৪	৯৩.৯	৯৪.১	৯৩.৯	৯৩.৯	৯৩.৫	৯৩.৭	৯৪.০	৯৪.১	৯৩.৮	৯৩.৯	৯৪.১	৯৪.২	৯৪.০	৯৪.৫	৯৪.৩	
	সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৪৭.৭	৪৫.২	৪৬.৮	৪৬.১	৪৬.৮	৪৭.৪	৪৭.৭	৫২.৬	৫৫.৯	৫৮.৭	৫৯.৬	৬০.৯	৬১.৭	৬৩.০	৬৩.৫	৬৪.৮	৬৬.৭	
	সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪৭.০	৫০.০	৪৯.৫	৫০.৫	৫২.৫	৫২.৫	৫২.৫	৫১.০	৪৮.৫	৫১.০	৫২.০	৫২.৫	৫১.০	৪৭.৫	৪৭.৫	৪৬.৫	৪১.০	
	ধাপ সমূহ																		
অঙ্কুরোদগম এবং চারা রোপণ				অঙ্গজ বৃদ্ধি				ফুল ও ফল				ফসল কাটা							
পোকাকার জীবন চক্র																			
	ডিম (৬ থেকে ১৫ দিন)		লার্ভা (১৩ থেকে ২৫ দিন)		পিউপা (৭ থেকে ২০ দিন)		প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)		প্রাপ্তবয়স্ক (১০ মাস)										