

খরিপ টমেটো আবহাওয়া পঞ্জিকা: দিনাজপুর অঞ্চল (জেলা সমূহ: দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়)

দিনাজপুর অঞ্চল	খরিপ টমেটো, জীবনকাল: ১৪০-১৫০ দিন																							
	মে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ)					জুন (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়)					জুলাই (আষাঢ়-শ্রাবণ)					আগস্ট (শ্রাবণ-ভাদ্র)					সেপ্টেম্বর (ভাদ্র-আশ্বিন)			
মাস	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮			
প্রধানসপ্তাহ	৩১.	৩৬.	৫৭.	৫৫.	৭৩.	৫৭.	৭৭.	১১১.	৯৬.	১০৯.	১০৫.	৮১.	৮৪.	৭০.	৬০.	৯৩.	১০৩.	৭১.	৬৬.	৬১.	৭৩.			
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০			
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (°সে:)	৩২.	৩২.	৩৩.	৩৩.	৩৩.	৩৩.	৩৩.	৩২.	৩২.	৩২.	৩২.১	৩২.	৩২.	৩২.	৩২.	৩২.	৩২.১	৩২.	৩২.	৩২.	৩২.			
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (°সে:)	২২.	২২.	২৩.	২৪.	২৪.	২৫.	২৫.	২৫.	২৬.	২৬.	২৬.	২৬.	২৬.	২৬.	২৬.	২৬.	২৬.	২৬.	২৬.	২৫.	২৫.			
গড় তাপমাত্রা (°সে:)	২৭.	২৭.	২৮.	২৮.	২৮.	২৯.	২৯.	২৯.	২৯.	২৯.	২৯.১	২৯.	২৯.	২৯.	২৯.	২৯.	২৯.১	২৯.	২৯.	২৯.	২৮.			
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৯২.	৯২.	৯২.	৯২.	৯২.	৯৩.	৯৩.	৯৪.	৯৪.	৯৫.	৯৪.	৯৪.	৯৪.	৯৪.	৯৪.	৯৫.	৯৫.	৯৫.	৯৫.	৯৬.	৯৬.			
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৫৭.	৫৭.	৫৯.	৬২.	৬২.	৬৫.	৬৭.	৭১.	৭১.	৭৩.	৭২.৭	৭১.	৭১.	৭০.	৭০.	৭২.	৭৩.১	৭১.	৭২.	৭১.	৭১.			
গড় আপেক্ষিক আদ্রতা (%)	৭৫.	৭৪.	৭৫.	৭৭.	৭৭.	৭৯.	৮০.	৮৩.	৮৩.	৮৪.	৮৩.	৮৩.	৮৩.	৮২.	৮২.	৮৩.	৮৪.	৮৩.	৮৪.	৮৩.	৮৩.			
সূর্যালোক ঘণ্টা (ঘণ্টা)	৪৯.	৫১.	৪৮.	৪৪.	৪২.	৪০.	৩৫.	২৭.	৩১.	২৭.	২৯.	৩১.	৩৬.	৩৬.	৩৭.	৩৪.	৩৪.	৩৭.	৩৭.	৩৬.	৩৩.			
বাতাসের দিক (ডিগ্রী)	১১৮	১১৫	১১৯	১০৮	১১৭	১১১	১১৮	১২০	১২১	১২৭	১২১	১২৬	১৩৪	১৩২	১৩২	১৩৪	১৩৯	১৪১	১৩৩	১৪৩	১৪৬			
বাতাসের গতি (কিমি./ঘণ্টা)	৩.৯	৩.৭	৪.৩	৩.৭	৩.৯	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৯	৩.৭	৩.৯	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭	৩.৭			
																								
ধাপ সমূহ	লতা রোপণ					অঙ্গজ বৃদ্ধি					ফুল আসা ও ফল ধারণ					ফসল উত্তোলন								
অনুকূল আবহাওয়া																								
তাপমাত্রা	তাপমাত্রা ১৫°সে এর নীচে হলে রোপনকৃত লতার বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ২৫-৩৫° সে. (অঙ্গজ বৃদ্ধি এবং ফুল আসা ও ফল ধারণ)																							
আপেক্ষিক	৬০-৮০%																							

আদ্রতা	
মাটির তাপমাত্রা	২০-২৫° সে.
সূর্যালোক ঘণ্টা	নূন্যতম ৬-৮ ঘণ্টা. (লতা লাগানোর সময়), ৮-১০ ঘণ্টা (অঙ্কজ বৃদ্ধি এবং ফুল আসা ও ফল ধারণ পর্যন্ত)
রোগবাহাইয়ের প্রাদুর্ভাবের উপযুক্ত আবহাওয়াঃ বেগুন	
মাছ পোকা	তাপমাত্রা:২৪-৩০° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৫৫-৭৫%
ইপিল্যাকনা বিটল	তাপমাত্রা:২৫-৩০° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৫৫-৬৫%
মিলি বাগ	তাপমাত্রা:২০-৩২° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৫৫-৬০%
সাদা মাছ	তাপমাত্রা:২২-৩২° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৫৫-৭৫%
লাল মাকড়	তাপমাত্রা:১৫-২৬° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৬০-৭০%
শিকড়ের গিট রোগ	তাপমাত্রা:১৮-২৬° সে, আপেক্ষিক আদ্রতা:৬০-৭০%
পাউডারী মিলডিউ	তাপমাত্রা:২২-২৭° সে., নিম্ন আদ্রতা দিনের বেলায় এবং উচ্চ আদ্রতা রাতের বেলা
আবহাওয়া সতর্কবার্তা	
বৃষ্টিপাত (মিমি.)	৪০ মিমি বা এর বেশী
মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া	মেঘাচ্ছন্ন অবস্থা
খরা	অনাবৃষ্টির কারণে সৃষ্ট খরা যদিও পটল ফসল খরা সহনশীল
ভেজা থাকার সময় কাল	২ থেকে ৩ দিন মাটিতে পানি জমি থাকলে
শিলাবৃষ্টি	মৌসুমী বৃষ্টিপাতের সাথে শিলাবৃষ্টি
প্রবল বাতাস	৪০ কিমি / ঘণ্টা বা তার বেশী
তাপমাত্রা (°সে.)	৩৫° সে. এর উপরে